Релцер



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** светло-коричневого цвета с мраморностью, круглые, плоские, с фаской, со специфическим запахом.

	1 таб.
алюминия гидроксид высушенный	250 мг
магния гидроксид	250 мг
симетикон	40 мг
сухой деглицирризинированный экстракт корней солодки	400 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), магния стеарат, какао-бобы, тальк, крахмал кукурузный, повидон К30, масло семян аниса, масло листьев мяты перечной.

4 шт. - упаковки безъячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (1) - пачки картонные.

◊ ***Суспензия для приема внутрь*** белого цвета с желтовато-коричневым оттенком, вязкая, с запахом банана и мяты.

	5 мл
алюминия гидроксида гель	6 г
магния гидроксид	80 мг
симетикон	100 мг
порошок корней солодки голой	400 мг

Вспомогательные вещества: гуаровая смола, сорбитол, натрия бензоат, натрия цитрат, метилпарабен, пропилпарабен, натрия гидроксид, натрия сахаринат, натрия гипохлорит, масло мяты перечной, ароматизатор банановый, бронопол, вода очищенная.

180 мл - флаконы пластиковые (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм. Нейтрализует свободную хлороводородную (соляную) кислоту в желудке, что приводит к снижению активности пепсина. Не вызывает вторичную гиперсекрецию желудочного сока. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшает влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку желудка. Ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Уменьшает газообразование в кишечнике.

Симетикон, входящий в состав препарата, уменьшает газообразование в кишечнике. Солодки корней экстракт деглицирризинированный усиливает защитное действие на слизистую оболочку желудка, способствуя регенерации слизистых клеток, улучшая качество и количество слизи, а также оказывает спазмолитическое действие.

Препарат ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Абсорбция компонентов препарата низкая.

Показания к применению:

Для таблеток и суспензии

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит;

— дискомфорт и боли в эпигастрии, диспептические симптомы (изжога, отрыжка с кислым привкусом) при погрешности в диете, избыточном употреблении кофе, никотина и алкоголя.

Для таблеток

— профилактика и лечение диспептических симптомов, возникающих в результате применения НПВС и ГКС.

Для суспензии

— острый гастрит, хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, дуоденит.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Грыжа
- Дуоденит
- Изжога
- Отрыжка
- Рефлюкс-эзофагит
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— непереносимость фруктозы;

— гипофосфатемия;

— выраженные нарушения функции почек;

— болезнь Альцгеймера;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст до 10 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и подросткам старше 15 лет препарат назначают по 1-2 таб. или по 5-10 мл (1-2 чайных ложки) 3-4 раза/сут. Максимальная суточная доза – 40 мл (8 чайных ложек).

Для **детей в возрасте от 10 до 15 лет** доза составляет 1/2 рекомендованной дозы для взрослых.

Продолжительность терапии составляет 14 дней. Вопрос о более длительном применении решается врачом индивидуально.

Препарат принимают ежедневно после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги.

При приеме таблетки разжевывают и запивают водой.

Перед приемом суспензию следует гомогенизировать, встряхнув флакон.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: запор, тошнота, рвота, спазмы желудка, изменение вкусовых ощущений.

Со стороны водно-электролитного баланса: гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, гипералюминиемия.

Со стороны мочевыделительной системы: нефрокальциноз, нарушение функции почек.

Со стороны костно-мышечной системы: остеомаляция, остеопороз.

Прочие: энцефалопатия, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью – жажда, снижение АД, гипорефлексия.

Передозировка:

Симптомы: при продолжительном применении в высоких дозах возможно образование камней в почках, запоры, сонливость, гипермагниемия; развитие признаков метаболического алкалоза (изменение настроения, боли в мышцах, нервозность, быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения).

Лечение: промывание желудка, искусственная рвота, прием активированного угля.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Релцер при одновременном применении может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая таким образом их всасывание. Релцер снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых H_2-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (в т.ч. ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, зальцитабина, желчных кислот (хенодезоксихолевой и урсодезоксихолевой), пеницилламина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопразола, мексилетина, кетоконазола.

При одновременном приеме с препаратами в кишечнорастворимых лекарственных формах изменение pH желудочного сока (более щелочная реакция) может привести к ускоренному разрушению оболочки и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

При совместном применении м-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата Релцер.

Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между приемом Релцера и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

При длительном применении (более 14 дней) необходим регулярный врачебный контроль.

Препарат содержит сорбитол и поэтому противопоказан при непереносимости фруктозы.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 10 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Relcer