

Релиф Адванс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для ректального и наружного применения** однородная, белого цвета с желтоватым оттенком, со слабым характерным запахом, не содержащая посторонних включений.

| | |
|-----------|--------------|
| | 1 г |
| бензокаин | 200 мг (20%) |

Вспомогательные вещества: масло печени акулы - 30 мг (3%), масло минеральное - 120 г (12%), вазелин - 617 мг (61.7%), пропиленгликоль - 20 мг (2%), метилпарагидроксибензоат - 2.4 мг (0.24%), пропилпарагидроксибензоат - 0.6 мг (0.06%), сорбитана моностеарат - 10 мг (1%).

28.4 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

◇ **Суппозитории ректальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, в форме торпеды.

| | |
|--------------------|----------------|
| | 1 супп. |
| масло печени акулы | 60 мг (3%) |
| бензокаин | 206 мг (10.3%) |

Вспомогательные вещества: масло какао-бобов, жир твердый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, крахмал кукурузный.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Суппозитории ректальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, в форме торпеды.

| | |
|--------------------|----------------|
| | 1 супп. |
| масло печени акулы | 60 мг (3%) |
| бензокаин | 206 мг (10.3%) |

Вспомогательные вещества: масло какао-бобов, жир твердый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, крахмал кукурузный.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогеморроидальный препарат.

Масло печени акулы оказывает противовоспалительное, гемостатическое, ранозаживляющее и иммуномодулирующее действие.

Бензокаин - местный анестетик, не оказывает резорбтивного действия.

Основа суппозиториев - масло какао - оказывает дополнительное смягчающее действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Релиф Адванс не предоставлены.

Показания к применению:

- наружный и внутренний геморрой;
- эрозии и трещины заднего прохода;
- анальный зуд;
- с целью обезболивания после проктологических операций;
- при проведении диагностических манипуляций.

Относится к болезням:

- [Зуд](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- тромбоэмболия;
- гранулоцитопения;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Суппозитории вводят в прямую кишку утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника. **Взрослым и детям старше 12 лет** рекомендуют вводить по 1 суппозиторию до 4 раз/сут.

Для применения мази следует снять с аппликатора защитный колпачок, прикрепить аппликатор к тубе и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно вводят с помощью аппликатора до 4 раз/сут (утром, днем и вечером и после каждого опорожнения кишечника).

После каждого применения следует тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок.

Детям в возрасте до 12 лет препарат назначают под врачебным контролем.

Побочное действие:

Местные реакции: гиперемия, зуд.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Возможные *симптомы* могут быть связаны с системной абсорбцией бензокаина, входящего в состав препарата, и включают сонливость, беспокойство, возбуждение; в тяжелых случаях - судороги; крайне редко - метгемоглобинемия (проявляется нарушениями дыхания и цианозом).

При значительном превышении рекомендуемых разовых и суточных доз входящего в состав препарата масла печени акулы возможно развитие склонности к повышенному свертыванию крови.

Лечение: при метгемоглобинемии - в/в введение метиленового синего.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Релиф Адванс применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) с осторожностью и только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Релиф Адванс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При случайном употреблении внутрь следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

При обильных кровянистых выделениях из прямой кишки или при сохранении болезненных симптомов более 7 дней необходимо дополнительно проконсультироваться с проктологом.

Использование в педиатрии

Вопрос о назначении препарата Релиф Адванс **детям в возрасте до 12 лет** следует решать индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

Применение в детском возрасте

Вопрос о назначении препарата Релиф Адванс детям в возрасте до 12 лет следует решать индивидуально в зависимости от клинической ситуации.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Relif_Advans