

## Релиф Ультра



### Код АТХ:

- [C05AA01](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** белого цвета, непрозрачные, в форме торпеды, с запахом рыбы.

	<b>1 супп.</b>
гидрокортизона ацетат	10 мг
цинка сульфата моногидрат	10 мг
масло печени акулы	60 мг

*Вспомогательные вещества:* метилпарабен - 0.4 мг, пропилпарабен - 0.4 мг, жир твердый - 1915.2 мг, кальция фосфат двузамещенный - 2 мг, магния стеарат - 2 мг.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный проктогеморроидальный препарат.

Гидрокортизона ацетат - стероидный гормон коры надпочечников, при местном применении оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее, противоаллергическое, сосудосуживающее и противозудное действие. Угнетает выделение медиаторов воспаления.

Цинка сульфат способствует заживлению ран и эрозий.

Масло печени акулы оказывает противовоспалительное, гемостатическое, ранозаживляющее, иммуномодулирующее действие.

### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике препарата Релиф Ультра не предоставлены.

### **Показания к применению:**

- наружный и внутренний геморрой;
- трещины и эрозии заднего прохода;
- проктит;
- анальный зуд, экзема и дерматит перианальной области.

### **Относится к болезням:**

- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Проктит](#)
- [Экзема](#)

### **Противопоказания:**

- бактериальная, грибковая и вирусная инфекция в зоне введения препарата;
- новообразования аноректальной зоны;
- туберкулез;
- синдром Иценко-Кушинга;
- тяжелые формы сахарного диабета;
- гипернатриемия;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз/сут.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* местные аллергические реакции (гиперемия, зуд).

### **Передозировка:**

Случаи передозировки препарата с расстройствами жизненно важных функций организма в медицинской практике не описаны.

## **Релиф Ультра**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Предполагается, что длительное применение Релиф Ультра в высоких дозах может привести к таким же последствиям, как системное применение в избыточных дозах ГКС.

*Симптомы:* гипергликемия, гипернатриемия, синдром Иценко-Кушинга, угнетение иммунитета, эрозии и язвы ЖКТ, остеопороз.

*Лечение:* отмена препарата, общепринятая дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Релиф Ультра не предоставлены.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При тяжелой артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма, иммунодефицитных состояниях, остеопорозе, сахарном диабете и другой эндокринной патологии, применение препарата допустимо только по строгим медицинским показателям, если ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск побочного действия или осложнений основного заболевания.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°C.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Relif\\_Ultra](http://drugs.thead.ru/Relif_Ultra)