Релиф Ультра



Код АТХ:

- C05AA01

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории ректальные*** белого цвета, непрозрачные, в форме торпеды, с запахом рыбы.

	1 супп.
гидрокортизона ацетат	10 мг
цинка сульфата моногидрат	10 мг
масло печени акулы	60 мг

Вспомогательные вещества: метилпарабен - 0.4 мг, пропилпарабен - 0.4 мг, жир твердый - 1915.2 мг, кальция фосфат двузамещенный - 2 мг, магния стеарат - 2 мг.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противогеморроидальный препарат.

Гидрокортизона ацетат - стероидный гормон коры надпочечников, при местном применении оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее, противоаллергическое, сосудосуживающее и противозудное действие. Угнетает выделение медиаторов воспаления.

Цинка сульфат способствует заживлению ран и эрозий.

Масло печени акулы оказывает противовоспалительное, гемостатическое, ранозаживляющее, иммуномодулирующее действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Релиф Ультра не предоставлены.

Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой;

— трещины и эрозии заднего прохода;

— проктит;

— анальный зуд, экзема и дерматит перианальной области.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Дерматит
- Зуд
- Проктит
- Экзема

Противопоказания:

— бактериальная, грибковая и вирусная инфекция в зоне введения препарата;

— новообразования аноректальной зоны;

— туберкулез;

— синдром Иценко-Кушинга;

— тяжелые формы сахарного диабета;

— гипернатриемия;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз/сут.

Побочное действие:

Возможно: местные аллергические реакции (гиперемия, зуд).

Передозировка:

Случаи передозировки препарата с расстройствами жизненно важных функций организма в медицинской практике не описаны.

Предполагается, что длительное применение Релиф Ультра в высоких дозах может привести к таким же последствиям, как системное применение в избыточных дозах ГКС.

Симптомы: гипергликемия, гипернатриемия, синдром Иценко-Кушинга, угнетение иммунитета, эрозии и язвы ЖКТ, остеопороз.

Лечение: отмена препарата, общепринятая дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Релиф Ультра не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При тяжелой артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма, иммунодефицитных состояниях, остеопорозе, сахарном диабете и другой эндокринной патологии, применение препарата допустимо только по строгим медицинским показателям, если ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск побочного действия или осложнений основного заболевания.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Relif_Ultra