

## [Релиф Ультра \(свечи\)](#)



### Код АТХ:

- [C05AA01](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

По 6 супп. в блистере из непрозрачной ПВХ-пленки. 2 блистера в картонной пачке.

### Состав:

Суппозитории для ректального применения	1 супп.
<i>активные вещества:</i>	
гидрокортизона ацетат	10 мг (0,5%)
цинка сульфата моногидрат	11 мг (0,55%)
<i>вспомогательные вещества:</i> метилпарагидроксибензоат 0,4 мг (0,02%); пропилпарагидроксибензоат — 0,4 мг (0,02%); какао бобов масло — 1974,2 мг (98,71%); кальция гидрофосфат безводный — 2 мг (0,1%); магния стеарат — 2 мг (0,1%)	

### Описание:

Непрозрачные суппозитории от бледно-желтого до светло-желтого цвета в форме торпеды.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаранты](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — регенерирующее, глюкокортикоидное, противовоспалительное местное.

#### Фармакодинамика

Гидрокортизона ацетат — стероидный гормон коры надпочечников; при местном применении обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим, противоаллергическим, сосудосуживающим и противозудным действием. Угнетает выделение медиаторов воспаления.

Цинка сульфат способствует заживлению ран и эрозий.

### Показания к применению:

- наружный и внутренний геморрой;
- трещины и эрозии заднего прохода;
- проктит;
- анальный зуд, экзема и дерматит перианальной области.

### Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Проктит](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

- бактериальная, грибковая и вирусная инфекция в зоне введения препарата;
- новообразования аноректальной зоны;
- туберкулез;
- синдром Иценко-Кушинга;
- тяжелые формы сахарного диабета;
- гипернатриемия;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз/сут.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* местные аллергические реакции (гиперемия, зуд).

## **Передозировка:**

Случаи передозировки препарата с расстройствами жизненно важных функций организма в медицинской практике не описаны.

Предполагается, что длительное применение Релиф Ультра в высоких дозах может привести к таким же последствиям, как системное применение в избыточных дозах ГКС.

*Симптомы:* гипергликемия, гипернатриемия, синдром Иценко-Кушинга, угнетение иммунитета, эрозии и язвы ЖКТ, остеопороз.

*Лечение:* отмена препарата, общепринятая дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Релиф Ультра не предоставлены.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При тяжелой артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма, иммунодефицитных состояниях, остеопорозе, сахарном диабете и другой эндокринной патологии, применение препарата допустимо только по строгим медицинским показателям, если ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск побочного действия или осложнений основного заболевания.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Relif\\_Ultra\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Relif_Ultra_svechi)