Релиф Ультра (свечи)



Код АТХ:

- C05AA01

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

По 6 супп. в блистере из непрозрачной ПВХ-пленки. 2 блистера в картонной пачке.

Состав:

Суппозитории для ректального применения	1 супп.
активные вещества:	
гидрокортизона ацетат	10 мг (0,5%)
цинка сульфата моногидрат	11 мг (0,55%)
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат 0,4 мг (0,02%); пропилпарагидроксибензоат — 0,4 мг (0,02%); какао бобов масло — 1974,2 мг (98,71%); кальция гидрофосфат безводный — 2 мг (0,1%); магния стеарат — 2 мг (0,1%)	

Описание:

Непрозрачные суппозитории от бледно-желтого до светло-желтого цвета в форме торпеды.

Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — регенерирующее, глюкокортикоидное, противовоспалительное местное.

Фармакодинамика

Гидрокортизона ацетат — стероидный гормон коры надпочечников; при местном применении обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим, противоаллергическим, сосудосуживающим и противозудным действием. Угнетает выделение медиаторов воспаления.

Цинка сульфат способствует заживлению ран и эрозий.

Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой;

— трещины и эрозии заднего прохода;

— проктит;

— анальный зуд, экзема и дерматит перианальной области.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Дерматит
- Зуд
- Проктит
- Экзема

Противопоказания:

— бактериальная, грибковая и вирусная инфекция в зоне введения препарата;

— новообразования аноректальной зоны;

— туберкулез;

— синдром Иценко-Кушинга;

— тяжелые формы сахарного диабета;

— гипернатриемия;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз/сут.

Побочное действие:

Возможно: местные аллергические реакции (гиперемия, зуд).

Передозировка:

Случаи передозировки препарата с расстройствами жизненно важных функций организма в медицинской практике не описаны.

Предполагается, что длительное применение Релиф Ультра в высоких дозах может привести к таким же последствиям, как системное применение в избыточных дозах ГКС.

Симптомы: гипергликемия, гипернатриемия, синдром Иценко-Кушинга, угнетение иммунитета, эрозии и язвы ЖКТ, остеопороз.

Лечение: отмена препарата, общепринятая дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Релиф Ультра не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При тяжелой артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма, иммунодефицитных состояниях, остеопорозе, сахарном диабете и другой эндокринной патологии, применение препарата допустимо только по строгим медицинским показателям, если ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск побочного действия или осложнений основного заболевания.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 27°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Relif_Ultra_svechi