

Релиф (свечи)



Код АТХ:

- [C05AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенилэфрин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Мазь для ректального и наружного применения** желтого цвета, не содержащая посторонних включений.

	100 г
масло печени акулы	3 г (3%)
фенилэфрина гидрохлорид	250 мг (0.25%)

Вспомогательные вещества: масло минеральное - 14 г, вазелин - 71.9 г, метилпарагидроксибензоат - 200 мг, пропилпарагидроксибензоат - 100 мг, ланолин безводный - 3 г, бензойная кислота - 100 мг, масло кукурузное - 50 мг, глицерол - 1 г, ланолиновый спирт - 750 мг, парафин - 2 г, масло тимьяновое - 80 мг, α-токоферол (вит. Е) - 50 мг, воск пчелиный белый - 2.52 г, вода очищенная - 1 г.

28.4 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

♦ **Суппозитории ректальные** желтоватого цвета, в форме торпеды, со слабым запахом рыбы и гладкой воскообразной поверхностью.

	1 супп.
фенилэфрина гидрохлорид	5 мг

Вспомогательные вещества: масло печени акулы - 60 мг, масло какао-бобов - 1710 мг, крахмал кукурузный - 224.2 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.4 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.4 мг.

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения геморроя.

Масло печени акулы оказывает местное противовоспалительное, гемостатическое и ранозаживляющее действие.

Фенилэфрина гидрохлорид является α -адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, отека тканей, зуда при геморрое.

Показания к применению:

- наружный и внутренний геморрой;
- трещины заднего прохода;
- анальный зуд.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Зуд](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- тромбоэмболическая болезнь;
- гранулоцитопения.

С осторожностью: артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, задержка мочи (гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Взрослые и дети старше 12 лет: снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазки аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода или по одному суппозиторию 4 раз/сут утром, вечером и после каждого опорожнения кишечника.

После каждого применения тщательно промыть аппликатор и поместить его в защитный колпачок. Мазь наносится также на кожу в области заднего прохода.

Побочное действие:

Редко - аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Из-за содержащегося фенилэфрина снижается действие гипотензивных лекарственных средств.

При одновременном назначении с антидепрессантами - ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет.

В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 27°C в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Relif_svechi