



## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторным действием.

Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргических соединений, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты. Ремаксол снижает цитолиз, что проявляется в снижении индикаторных ферментов: АЛТ и АСТ.

Ремаксол способствует снижению содержания билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов - ЩФ и ГГТ, способствует окислению холестерина в желчные кислоты.

### Фармакокинетика

При в/в капельном введении входящие в состав естественные компоненты быстро распределяются в тканях организма, утилизируясь практически мгновенно.

Продукты метаболизма выводятся с мочой и не накапливаются в организме.

## Показания к применению:

— нарушения функции печени вследствие острого или хронического ее повреждения (токсические, алкогольные, лекарственные гепатиты);

— в комплексном лечении вирусных гепатитов (дополнительно к этиотропной терапии).

## Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)

## Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст;
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при нефролитиазе, подагре, гиперурикемии.

## Способ применения и дозы:

Ремаксол вводят только в/в капельно в суточной дозе от 400 мл до 800 мл в течение 3-12 дней в зависимости от тяжести заболевания. Скорость введения 40-60 капель (2-3 мл)/мин.

## Побочное действие:

*Со стороны организма в целом:* при быстром введении раствора - гиперемия кожных покровов различной степени выраженности, чувство жара, першение в горле, сухость во рту (не требующие отмены препарата).

*Аллергические реакции:* сыпь и кожный зуд (устраняются применением антигистаминных препаратов).

*Со стороны обмена веществ:* снижение концентрации глюкозы и увеличение содержания мочевой кислоты в крови (ввиду активации препаратом аэробных процессов в организме).

*Прочие:* редко - тошнота, головная боль и головокружение.

**Передозировка:**

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Ремаксол с другими лекарственными средствами не предоставлены.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется смешивание в одном флаконе с другими лекарственными средствами для в/в введения.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Remaksol>