

Реместип



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Терлипрессин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Аналог вазопрессина. Оказывает действие, сходное с действием гормона задней доли гипофиза (вазопрессина). Представляет собой синтетический полипептид, который является неактивным пролекарством и биотрансформируется в организме в липрессин, являющийся синтетическим аналогом вазопрессина. Липрессин повышает тонус гладкой мускулатуры сосудов и ЖКТ, вызывает сосудосуживающий и гемостатический эффекты.

Показания к применению:

Кровотечения из ЖКТ, органов мочевыделительной и половой системы.

Слабость родовой деятельности.

Противопоказания:

I триместр беременности, токсикозы беременных, эпилепсия, повышенная чувствительность к терлипрессину.

Способ применения и дозы:

Вводят в/м, в/в, парацервикально, интрацервикально. Дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от клинической ситуации.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: повышенная перистальтика кишечника, кишечные колики, отрыжка, тошнота.

Реместип

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Со стороны половой системы: повышенная сократимость матки.

Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, брадикардия, развитие инфаркта миокарда, сердечная недостаточность.

Прочие: бледность кожных покровов, некроз в месте инъекции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре беременности, при токсикозах беременных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с окситоцином и метилэргометрином наблюдается усиление сокращения гладкой мускулатуры матки и сосудов.

Усиливает гипотензивный эффект бета-адреноблокаторов.

При одновременном применении с препаратами, уменьшающими ЧСС, повышается риск развития выраженной брадикардии.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют у пациентов с ИБС, тяжелой артериальной гипертензией и нарушениями ритма сердца, бронхиальной астмой, у лиц пожилого возраста.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Remestip>