Ренель



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми, коричневатыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской; без запаха.

	1 таб.
Alumina (алюмина) D12	75 мг
Berberis vulgaris (берберис вульгарис) D2	15 мг
Acidum nitricum (ацидум нитрикум) D4	30 мг
Cantharis (кантарис) D5	30 мг
Plumbum aceticum (плюмбум ацетикум) D6	30 мг
Pareira brava (парейра брава) D3	30 мг
Sabal serrulatum (сабаль серрулятум) D2	30 мг
Causticum Hahnemanni (каустикум Ганеманни) D4	60 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания мочевыводящих путей;

— мочекаменная болезнь.

Относится к болезням:

- Мочекаменная болезнь

Противопоказания:

— детский возраст (до 3 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или спустя 1 час после приема пищи. В острых случаях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения определяется лечащим врачом.

Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Использование препарата не исключает применение аллопатических лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Renel