# Ренни-Тал



## Код АТХ:

- A02AD04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гидроталцит

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

◊ ***Таблетки жевательные*** белого цвета, круглые, плоские, скошенные к краю, с оттиском в виде фирменного знака ("байеровский" крест) с одной стороны и "TALCID" - с другой.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| гидроталцит | 500 мг |

Вспомогательные вещества: маннитол, крахмал кукурузный, магния стеарат, натрия сахаринат, ароматизатор мятный, ароматизатор банановый.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Антацидный препарат. Имеет кристаллическую слоисто-сетчатую структуру с низким содержанием алюминия и магния. Тальцид обеспечивает быструю и продолжительную нейтрализацию соляной кислоты желудочного сока без чрезмерного защелачивания желудочного содержимого с поддержанием pH на оптимальном терапевтическом уровне между 3 и 5 в течение 75-90 мин; оказывает гастропротекторное действие за счет длительного связывания пепсина, соляной кислоты, желчных кислот; также активизирует собственные факторы защиты желудка.

***Фармакокинетика***

Благодаря слоисто-сетчатой структуре Тальцида, высвобождение ионов алюминия и магния происходит в желудке постепенно в зависимости от уровня pH. 1 г гидроталцита обладает буферной емкостью 27.8 мэкв. После приема Тальцида уровень алюминия и магния в плазме крови при нормальной функции почек остается в пределах физиологической нормы, проникновение ионов алюминия и магния в нервную и костные ткани не наблюдается.

## Показания к применению:

—острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. гастрит, дуоденит);

—язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

—нарушения функции ЖКТ, связанные с неправильным питанием или приемом препаратов, обладающих раздражающим действием на слизистую оболочку желудка;

—рефлюкс-эзофагит;

—изжога, отрыжка, чувство переполнения в желудке.

## Относится к болезням:

- Гастрит
- Дуоденит
- Отрыжка
- Эзофагит

## Противопоказания:

—индивидуальная непереносимость.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут (через 1-2 ч после приема пищи и перед сном). Таблетки следует разжевать и запить водой. Длительность приема при *язвенной болезни* составляет в среднем 4 недели.

Разовая доза для **детей** составляет 1/2-1 таб.

## Побочное действие:

*Возможно:* частый стул (диарея).

При приеме Тальцида нежелательные побочные эффекты наблюдаются редко и связаны в основном с длительным приемом препарата.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Тальцид не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В настоящее время не сообщалось о случаях возникновения нежелательных эффектов при применении Тальцида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

В *экспериментальных исследованиях* не выявлено тератогенного действия Тальцида.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Тальцид снижает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда, фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин).

## Особые указания и меры предосторожности:

1 таб. Тальцида содержит 0.0086 XE и незначительное количество натрия сахарината, что дает возможность назначать препарат пациентам с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Не рекомендуется применять препарат пациентам с нарушением выделительной функцией почек.

Не рекомендуют принимать Тальцид одновременно с напитками, содержащими кислоту (соки, вино).

Тальцид следует принимать за 1-2 ч до или после приема препаратов, содержащих железо, производных хенодезоксихолевой кислоты, дигоксина, циметидина, производных кумарина.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном месте.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## Срок годности:

5 лет.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Renni-Tal