# Репарэф



## Код АТХ:

- D11AX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Биен
- Гидроксиметилхиноксалиндиоксид

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат.

Гидроксиметилхиноксилиндиоксид - хиноксалин, антибактериальное бактерицидное средство широкого спектра действия.

Биен - комплекс этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот, стабилизированный α-токоферола ацетатом, в состав которого входят эссенциальныее жирные кислоты - арахидоновая (предшественник Pg и лейкотриенов), олеиновая, линолевая, линоленовая, являющиеся важнейшим компонентом биологических мембран клеток и тканей.

Полиэтиленоксидная мазевая основа, обладающая высокой гидрофильностью, обеспечивает повышение биодоступности биена и антигидратационный эффект при нанесении мази на мокнущую раневую поверхность кожи, способствует проявлению регенеративных свойств препарата в I фазу раневого процесса (при обильном гнойном отделяемом). Способствует быстрому очищению ран от гнойно-некротических масс, заживлению ран небольшого размера, а при обширных гнойных поражениях позволяет подготовить раны к хирургическому лечению.

## Показания к применению:

— гнойные раны;

— ожоги различной этиологии и локализации;

— пролежни;

— трофические язвы.

## Относится к болезням:

- Ожоги
- Пролежни
- Раны

## Противопоказания:

— гиперчувствительность.

## Способ применения и дозы:

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на поверхность раны после первичной хирургической обработки и/или промывания антисептическим раствором. Сверху накладывают стерильную марлевую салфетку, пропитанную мазью с внутренней стороны. В зависимости от состояния и площади ран аппликацию повторяют 1-2 раза/сут в течение 4-5 дней.

## Побочное действие:

Жжение в месте нанесения.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Reparef