Репарил-Гель Н



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения***	**100 г**
диэтиламина салицилат	5 г
эсцин	1 г

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противовоспалительный препарат для местного применения.

Эсцин обладает капилляропротекторным эффектом, уменьшает местный отек, боль, напряжение тканей.

Диэтиламина салицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Ментол обладает местноохлаждающим действием.

Показания к применению:

— болевой синдром при заболеваниях позвоночника (ущемление межпозвоночного диска, остеохондроз, люмбаго, ишиас);

— артралгия при артрите;

— артралгия и миалгия при ревматизме;

— болевой синдром при закрытых травмах с разрывом или растяжением связок, отеком, гематомой;

— тендовагинит;

— флебит поверхностных вен;

— тромбофлебит;

— варикозное расширение вен;

— профилактика и лечение местных осложнений после в/в инъекций или инфузий (предупреждение развития гематом).

Относится к болезням:

- Артралгия
- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Гематомы
- Ишиас
- Люмбаго
- Миалгия
- Остеохондроз
- Растяжение
- Ревматизм
- Тендовагинит
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Флебит

Противопоказания:

Гель не следует наносить на раны, слизистые оболочки и на участки кожи, подвергавшиеся облучению.

Способ применения и дозы:

Гель следует наносить на место повреждения несколько раз/сут, равномерно распределяя по всей поверхности (втирать в кожу нет необходимости).

Побочное действие:

Аллергические реакции: очень редко - гиперемия, зуд, кожная сыпь.

Передозировка:

На настоящий момент случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На данный момент лекарственное взаимодействие препарата Репарил-Гель не описано.

Источник: http://drugs.thead.ru/Reparil-Gel_N