

## [Репарил-Гель Н](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

<b>Гель для наружного применения</b>	<b>100 г</b>
диэтиламина салицилат	5 г
Эсцин	1 г

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный противовоспалительный препарат для местного применения.

Эсцин обладает капилляропротекторным эффектом, уменьшает местный отек, боль, напряжение тканей.

Диэтиламина салицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Ментол обладает местноохлаждающим действием.

### **Показания к применению:**

— болевой синдром при заболеваниях позвоночника (ущемление межпозвоночного диска, остеохондроз, люмбаго, ишиас);

— артралгия при артрите;

— артралгия и миалгия при ревматизме;

— болевой синдром при закрытых травмах с разрывом или растяжением связок, отеком, гематомой;

— тендовагинит;

— флебит поверхностных вен;

— тромбофлебит;

— варикозное расширение вен;

— профилактика и лечение местных осложнений после в/в инъекций или инфузий (предупреждение развития гематом).

### Относится к болезням:

- [Артралгия](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Гематомы](#)
- [Ишиас](#)
- [Люмбаго](#)
- [Миалгия](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Растяжение](#)
- [Ревматизм](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Флебит](#)

### Противопоказания:

Гель не следует наносить на раны, слизистые оболочки и на участки кожи, подвергавшиеся облучению.

### Способ применения и дозы:

Гель следует наносить на место повреждения несколько раз/сут, равномерно распределяя по всей поверхности (втирать в кожу нет необходимости).

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* очень редко - гиперемия, зуд, кожная сыпь.

### Передозировка:

На настоящий момент случаев передозировки не зарегистрировано.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

На данный момент лекарственное взаимодействие препарата Репарил-Гель не описано.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Reparil-Gel\\_N](http://drugs.thead.ru/Reparil-Gel_N)