

Реписан



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** в виде жидкости с зеленоватым оттенком, со вкусом календулы.

	100 мл
календула (Calendula) D1	10 мл
арника (Arnica) D6	10 мл
зверобой продырявленный (Hypericum) D6	10 мл
рута (Ruta) D6	10 мл
симфитум (Symphytum) D6	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по весу.

20 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла с капельницей (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, регенерирующее, капилляропротекторное, ранозаживляющее действие. Способствует рассасыванию рубцовых тканей, стимулирует остеосинтез.

Фармакокинетика

Действие препарата Реписан является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В комплексной терапии:

— воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (в т.ч. остеохондрозы, артриты, артрозы, тендовагиниты, бурситы, эпикондилиты);

— последствий травм (в т.ч. ушибы, растяжения связок, переломы костей);

— замедленного заживления ран.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Бурсит](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Травмы](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)
- [Эпикондилит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата **детям в возрасте от 3 до 12 лет** назначают по 5 капель, **взрослым и подросткам** - по 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность курса - не менее 2 мес.

При лечении последствий травм **детям в возрасте от 3 до 12 лет** назначают по 5 капель, **взрослым и подросткам** - по 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность курса при ушибах и растяжениях - 1 неделя; при замедленном заживлении ран - 1-3 недели; при переломах костей - 2 мес.

В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможно назначение препарата каждые 0.5-1 ч **детям в возрасте от 3 до 12 лет** - по 3-5 капель, **взрослым и подросткам** - по 8-10 капель, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды и принимают подержав во рту некоторое время перед проглатыванием.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Реписан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Реписан с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Реписан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Поскольку препарат Реписан содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

При *лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата* **детям в возрасте от 3 до 12 лет** назначают по 5 капель, **подросткам** - по 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность курса - не менее 2 мес.

При *лечении последствий травм* **детям в возрасте от 3 до 12 лет** назначают по 5 капель, **подросткам** - по 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность курса при *ушибах и растяжениях* - 1 неделя; при *замедленном заживлении ран* - 1-3 недели; при *переломах костей* - 2 мес.

В *начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов*, возможно назначение препарата каждые 0.5-1 ч **детям в возрасте от 3 до 12 лет** - по 3-5 капель, **подросткам** - по 8-10 капель, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

5 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Repisan>