Ревалид



Код АТХ:

- A11AB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** твердые желатиновые, размер №0, с прозрачной крышечкой темно-зеленого цвета и прозрачным корпусом светло-зеленого цвета; содержимое капсул - порошок от коричневато-желтоватого до желтовато-коричневого цвета с более светлыми и более темными включениями, с характерным запахом.

	1 капс.
тиамина гидрохлорид (вит. B_1)	1.5 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	50 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	10 мг
пара-аминобензойная кислота (вит. B_x)	20 мг
железо	2 мг
медь	500 мкг
цинк	2 мг
микроэлементы в хелатокомплексе	65 мг
L-цистин	50 мг
D,L-метионин	100 мг
экстракт проса	50 мг
экстракт зародышей пшеницы	50 мг
медицинские дрожжи	50 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный - 4.5 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 98 мг, индигокармин (E132) - 0.05 мг, хинолиновый желтый (E104) - 0.11 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Компоненты препарата способствуют нормализации метаболических процессов.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Ревалид не предоставлены.

Показания к применению:

Заболевания, сопровождающиеся нарушением структуры волос и ногтей и выпадением волос:

— для улучшения поверхностной структуры и внешнего вида волос и уменьшения их ломкости;

— для улучшения трофики волосяных луковиц и ногтей;

— для повышения устойчивости и замедления выпадения волос в результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и нежелательных воздействий (механические повреждения; воздействие химической природы - окраска волос; воздействие рентгеновских и ультрафиолетовых лучей).

Противопоказания:

— при выпадении волос или повреждениях участков кожи головы, вызванных гормональными нарушениями;

— при воспалительных и грибковых заболеваниях ногтей;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым — по 1 капсуле 3 раза/сут во время еды или непосредственно перед едой. Курс лечения - 2-3 мес. Возможны повторные курсы после рекомендации врача.

В *особо тяжелых случаях (при интенсивном или диффузном выпадении волос)* предлагается усиленный курс лечения: по 2 капсулы 3 раза/сут в течение первого месяца, а затем можно перейти на обычный курс лечения: по 1 капсуле 3 раза/сут по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Со стороны пищеварительной системы: при дозировке 6 капсул/сут могут появляться незначительные нарушения в пищеварении, в этом случае следует сократить дозу до 3 капсул/сут.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уменьшает интенсивность действия сульфаниламидов.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Препарат назначают взрослым.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Revalid