Ревит



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Драже***	**1 драже**
аскорбиновая кислота	35 мг
ретинола пальмитат	1.38 мг
рибофлавин	1 мг
тиамина гидрохлорид	1 мг

100 шт. - банки полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологический эффект драже Ревит обусловлен входящими в его состав витаминами.

Ретинола пальмитат (витамин А) преимущественно обеспечивает нормализацию процессов белкового и углеводного обменов.

Тиамина гидрохлорид (витамин B_1) обеспечивает нормальную функциональную деятельность нервной, сердечно-сосудистой систем, пищеварительного тракта.

Рибофлавин (витамин B_2) является важным компонентом в белковом, жировом и углеводном обмене, принимает участие в поддержке нормальной зрительной функции глаза.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене углеводов,

свертывании крови, регенерации тканей.

Показания к применению:

— в качестве профилактического средства у детей и взрослых при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах (период интенсивного роста, повышенная физическая или умственная нагрузка, беременность и период лактации, при несбалансированном или неполноценном питании);

— в комплексной терапии в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 3-х лет.

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь через 10-15 мин после еды. **Взрослым** – по 1 драже 3 раза/сут. **Детям с 3 до 7 лет** – 1-2 драже в сут, **от 7 до 15 лет** – по 1 драже 2-3 раза/сут. Курс лечения 30-60 дней. Курс лечения по рекомендации врача может быть повторен после перерыва (1-3 месяца). При *беременности* – 1 драже/сут.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет (совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина). Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежании передозировки.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 1 год. Не использовать после срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Revit