Ревма-гель



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** прозрачный, желто-коричневого цвета.

	10 г
гомеопатическая настойка Rhus toxicodendron	500 мг
гомеопатическая настойка Ledum	500 мг
гомеопатическая настойка Symphytum ad usum externum	1 г

Вспомогательные вещества: р-р натрия гидроксида 32%, карбомер, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при воспалительных и воспалительно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательной системы. Усиливает кровоснабжение тканей, оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Уменьшает спастичность скелетной мускулатуры.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Ревма-Гель не изучена.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний суставов;

— миалгии и при растяжениях мышц;

— люмбаго.

Относится к болезням:

- Люмбаго

- Миалгия

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к Rhus toxicodendron (побеги сумаха ядовитого) и другим компонентам препарата;

— детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 1 года гель наносят на болезненные места, слегка втирая, 3 раза/сут.

Возможно применение Ревма-Геля в течение длительного времени.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожный зуд, кожная сыпь.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ревма-Гель не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Ревма-Гель при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ревма-Гель с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Ревма-Геля возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Ревма-Геля возможно использование других лекарственных препаратов.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 1 года.

Детям старше 1 года гель наносят на болезненные места, слегка втирая, 3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Revma-gel