

Ревма-гель



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Гель для наружного применения** прозрачный, желто-коричневого цвета.

	10 г
гомеопатическая настойка Rhus toxicodendron	500 мг
гомеопатическая настойка Ledum	500 мг
гомеопатическая настойка Symphytum ad usum externum	1 г

Вспомогательные вещества: р-р натрия гидроксида 32%, карбомер, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при воспалительных и воспалительно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательной системы. Усиливает кровоснабжение тканей, оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Уменьшает спастичность скелетной мускулатуры.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Ревма-Гель не изучена.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

- воспалительных заболеваний суставов;
- миалгии и при растяжениях мышц;
- люмбаго.

Относится к болезням:

- [Люмбаго](#)

- [Миалгия](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к *Rhus toxicodendron* (побеги сумаха ядовитого) и другим компонентам препарата;
- детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 1 года гель наносят на болезненные места, слегка втирая, 3 раза/сут.

Возможно применение Ревма-Геля в течение длительного времени.

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - кожный зуд, кожная сыпь.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ревма-Гель не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата Ревма-Гель при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ревма-Гель с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Ревма-Геля возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Ревма-Геля возможно использование других лекарственных препаратов.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 1 года.

Детям старше 1 года гель наносят на болезненные места, слегка втирая, 3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 0° до 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Ревма-гель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Revma-gel>