# Рибоксин

## Код АТХ:

- C01EB

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Инозин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

## Состав:

**Одна таблетка содержит**

*Активное вещество:* инозин 200 мг

*Вспомогательные вещества:* крахмал картофельный 54,1 мг, метилцеллюлоза 3,2 мг, сахароза 10 мг, стеариновая кислота 2,7 мг

*Состав оболочки:* опадрай II желтый (спирт поливиниловый, титана диоксид, тальк, макрогол 3350 (полиэтиленгликоль 3350), железа (III) оксид, лак алюминиевый на основе хинолинового желтого) - 8 мг.

## Описание:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до желто-оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, слегка шероховатые; на поперечном разрезе видны два слоя: ядро белого или белого со слегка желтоватым оттенком и оболочка от светло-желтого до желто-оранжевого цвета.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Инозин относится к группе лекарственных средств, регулирующих метаболические процессы. Препарат является предшественником синтеза пуриновых нуклеотидов: аденозинтрифосфата и гуанозинтрифосфата.

Оказывает антигипоксическое, метаболическое и антиаритмическое действие. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение, предотвращает последствия интраоперационной ишемии почек. Принимает непосредственное участие в обмене глюкозы и способствует активизации обмена в условиях гипоксии и при отсутствии аденозинтрифосфата.

Активирует метаболизм пировиноградной кислоты для обеспечения нормального процесса тканевого дыхания, а также способствует активированию ксантиндегидрогеназы. Стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает активность некоторых ферментов цикла Кребса. Проникая в клетки, повышает энергетический уровень, оказывает положительное действие на процессы обмена в миокарде, увеличивает силу сокращений сердца и способствует более полному расслаблению миокарда в диастоле, в результате чего возрастает ударный объем крови.

Снижает агрегацию тромбоцитов, активирует регенерацию тканей (особенно миокарда и слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

***Фармакокинетика***

Хорошо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Метаболизируется в печени с образованием глюкуроновой кислоты и последующим ее окислением. В незначительном количестве выводится почками.

## Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояних:

— в комплексной терапии ишемической болезни сердца, после перенесенного инфаркта миокарда, нарушений ритма сердца, обусловленных применением сердечных гликозидов.

— при гепатитах, циррозе, жировой дистрофии печени, вызванной алкоголем или лекарственными средствами и урокопропорфирии.

## Относится к болезням:

- Гепатит
- Жировая дегенерация печени
- Инфаркт миокарда
- Ишемическая болезнь сердца
- Цирроз печени

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— повышенная чувствительность к препарату;

— подагра;

— гиперурикемия;

— непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы, галактозы или дефицит сахаразы, изомальтазы.

С осторожностью: почечная недостаточность, сахарный диабет.

## Способ применения и дозы:

Назначают взрослым внутрь до еды.

Суточная доза при приеме внутрь составляет 0,6-2,4 г. В первые дни лечения суточная доза равна 0,6-0,8 г (по 200 мг 3-4 раза в день). В случае хорошей переносимости дозу повышают (на 2-3 день) до 1,2 г (0,4 г 3 раза в день), при необходимости - до 2,4 г в день.

Длительность курса - от 4 недель до 1,5-3 месяцев.

При урокопропорфирии суточная доза составляет 0,8 г (по 200 мг 4 раза в день). Препарат принимают ежедневно в течение 1-3 месяцев.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* в виде крапивницы, кожного зуда, гиперемии кожи (требуется отмена препарата).

*Прочие:* редко при лечении препаратом повышается концентрация мочевой кислоты в крови и обострение подагры (при длительном применении).

## Передозировка:

Случаев передозировки препарата при клиническом применении не зарегистрировано.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Рибоксин во время беременности и в период лактации не установлена. Применение препарата Рибоксин противопоказано во время беременности. На время лечения препаратом Рибоксин следует прекратить грудное вскармливание.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Иммунодепрессанты (азатиоприн, антилимфолин, циклоспорин, тимодепрессин и др.) при одновременном применении снижают эффективность Рибоксина.

## Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения препаратом Рибоксин следует контролировать концентрацию мочевой кислоты в крови и моче.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 таблетка препарата соответствует 0.00641 хлебной единицы.

Не влияет на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами, требующими повышенной концентрации внимания.

## Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Riboksin