# Рингера-Ацетат



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, устраняет метаболический ацидоз, нормализует кислотно-основной и водно-электролитный состав крови. Лечебный эффект препарата обусловлен временным увеличением объема циркулирующей крови, восполнением дефицита натрия, калия и кальция, а также превращением иона ацетата в гидрокарбонат.

## Показания к применению:

— шок;

— термическая травма;

— острая кровопотеря;

— гипогидратация (изотоническая и гипотоническая формы);

— метаболический ацидоз;

— острый разлитой перитонит;

— кишечная непроходимость (для коррекции водного и солевого баланса);

— декомпенсация электролитных нарушений у больных с кишечными свищами;

— лечебный плазмаферез (диализ-фильтрационный метод).

## Относится к болезням:

- Баланит
- Гипотония
- Перитонит
- Травмы

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— алкалоз;

— внеклеточная гипергидратация;

— гипертоническая дегидратация;

— гипернатриемия;

— состояния, при которых противопоказано введение больших объемов жидкости: тяжелая хроническая сердечная недостаточность, отек мозга, отек легких, анурия.

С *осторожностью:* сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, почечная и/или печеночная недостаточность, олигурия.

## Способ применения и дозы:

В/в капельно, **взрослым** - со скоростью 60-80 кап/мин или струйно, суточная доза 5-20 мл/кг, при необходимости - 30-40 мл/кг. Суточная доза **для детей** - 5-10 мл/кг, скорость введения - 30-60 кап/мин. Курс лечения - 3-5 дней.

При *лечебном плазмаферезе* вводят в 2-кратном объеме по сравнению с удаленной плазмой (1.2-2.4 л), в сочетании с коллоидными растворами (в случае выраженной гиповолемии).

## Побочное действие:

Аллергические реакции.

При введении больших объемов раствора: гипергидратация, хлоридный ацидоз, гипернатриемия, гипокалиемия.

## Передозировка:

*Симптомы:* отек сосочков зрительного нерва, отек мозга, судороги, гипертермия. Токсическая доза натрия хлорида - 100-150 г.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно увеличение задержки натрия в организме при одновременном приеме НПВС, андрогенов, эстрогенов, анаболических гормонов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов.

При приеме с калийсберегающими диуретиками - развитие гиперкалиемии.

Кальций в комбинации с сердечными гликозидами увеличивает вероятность их токсических эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

При лечении выраженной гиповолемии рекомендуется одновременная терапия с коллоидными растворами, кровью и ее компонентами (вследствие непродолжительного действия препарата).

При длительном введении больших доз раствора желательно проводить контроль электролитов в плазме и моче.

***При нарушениях функции почек***

С *осторожностью:* почечная недостаточность.

***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью:* печеночная недостаточность.

***Применение в детском возрасте***

Суточная доза **для детей** - 5-10 мл/кг, скорость введения - 30-60 кап/мин.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ringera-Acetat