

## [Рингера-Ацетат](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, устраняет метаболический ацидоз, нормализует кислотно-основной и водно-электролитный состав крови. Лечебный эффект препарата обусловлен временным увеличением объема циркулирующей крови, восполнением дефицита натрия, калия и кальция, а также превращением иона ацетата в гидрокарбонат.

### Показания к применению:

- шок;
- термическая травма;
- острая кровопотеря;
- гипогидратация (изотоническая и гипотоническая формы);
- метаболический ацидоз;
- острый разлитой перитонит;
- кишечная непроходимость (для коррекции водного и солевого баланса);
- декомпенсация электролитных нарушений у больных с кишечными свищами;
- лечебный плазмаферез (диализ-фильтрационный метод).

### Относится к болезням:

- [Баланит](#)
- [Гипотония](#)
- [Перитонит](#)
- [Травмы](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- алкалоз;
- внеклеточная гипергидратация;
- гипертоническая дегидратация;
- гипернатриемия;
- состояния, при которых противопоказано введение больших объемов жидкости: тяжелая хроническая сердечная недостаточность, отек мозга, отек легких, анурия.

С *осторожностью*: сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, почечная и/или печеночная недостаточность, олигурия.

## Способ применения и дозы:

В/в капельно, **взрослым** - со скоростью 60-80 кап/мин или струйно, суточная доза 5-20 мл/кг, при необходимости - 30-40 мл/кг. Суточная доза **для детей** - 5-10 мл/кг, скорость введения - 30-60 кап/мин. Курс лечения - 3-5 дней.

При *лечебном плазмаферезе* вводят в 2-кратном объеме по сравнению с удаленной плазмой (1.2-2.4 л), в сочетании с коллоидными растворами (в случае выраженной гиповолемии).

## Побочное действие:

Аллергические реакции.

При введении больших объемов раствора: гипергидратация, хлоридный ацидоз, гипернатриемия, гипокалиемия.

## Передозировка:

*Симптомы*: отек сосочков зрительного нерва, отек мозга, судороги, гипертермия. Токсическая доза натрия хлорида - 100-150 г.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно увеличение задержки натрия в организме при одновременном приеме НПВС, андрогенов, эстрогенов, анаболических гормонов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов.

При приеме с калийсберегающими диуретиками - развитие гиперкалиемии.

Кальций в комбинации с сердечными гликозидами увеличивает вероятность их токсических эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

При лечении выраженной гиповолемии рекомендуется одновременная терапия с коллоидными растворами, кровью и ее компонентами (вследствие непродолжительного действия препарата).

При длительном введении больших доз раствора желательно проводить контроль электролитов в плазме и моче.

### **При нарушениях функции почек**

С *осторожностью*: почечная недостаточность.

### **При нарушениях функции печени**

С *осторожностью*: печеночная недостаточность.

### **Применение в детском возрасте**

Суточная доза **для детей** - 5-10 мл/кг, скорость введения - 30-60 кап/мин.

## **Рингера-Ацетат**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ringera-Acetat>