Ринитал



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊***Таблетки сублингвальные*** круглые, плоскоцилиндрические, белого цвета, с фаской.

	1 таб.
Luffa operculata D4	25 мг
Galphimia glauca D3	25 мг
Cardiospermum halicacabum D3	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

20 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат с противоаллергическим действием. Оказывает противоотечное, противозудное и противовоспалительное действие. Уменьшает повышенную секрецию в пазухах носа.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Ринитал не изучена.

Показания к применению:

— аллергический ринит, вызванный пыльцой растений;

— круглогодичный аллергический ринит (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Астения
- Ринит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *остром течении заболевания* **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения. В дальнейшем назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 8 раз/сут) до наступления улучшения. В дальнейшем назначают по 1-2 таб. 2 раза/сут.

При *аллергическом рините, вызванном пыльцой растений,* с *профилактической целью* **взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. 3 раза/сут; **детям от 6 до 12 лет** назначают по 1 таб. 2 раза/сут. Лечение следует начинать за 6 недель до появления пыльцы, вызывающей аллергию.

Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая их во рту.

Возможно длительное применение препарата.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Ринитал не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости применения препарата Ринитал при беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Ринитал не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Ринитала возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При применении Ринитала допускается использование других лекарственных препаратов.

Применение в детском возрасте

При *остром течении заболевания* **детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения. В дальнейшем назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 8 раз/сут) до наступления улучшения. В

дальнейшем назначают по 1-2 таб. 2 раза/сут.

При *аллергическом рините, вызванном пыльцой растений,* с *профилактической целью* **детям старше 12 лет** назначают по 1 таб. 3 раза/сут; **детям от 6 до 12 лет** назначают по 1 таб. 2 раза/сут. Лечение следует начинать за 6 недель до появления пыльцы, вызывающей аллергию.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре от 15° до 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

5 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinital