

## Риномарис



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ксилометазолин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде бесцветного прозрачного раствора без запаха.

	<b>10 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	5 мг

Вспомогательные вещества: вода Адриатического моря - 2.46305 г, калия дигидрофосфат - 4.93 мг, вода очищенная - до 10 мл.

10 мл - флаконы пластиковые (1) с дозирующим устройством и распылительной головкой - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный 0.1%** в виде прозрачного прозрачного раствора без запаха.

	<b>10 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	10 мг

Вспомогательные вещества: вода Адриатического моря - 2.4162 г, калия дигидрофосфат - 4.9 мг, вода очищенная - до 10 мл.

10 мл - флаконы пластиковые (1) с дозирующим устройством и распылительной головкой - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для интраназального применения. Ксилометазолин оказывает альфа-адреномиметическое действие: вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа и устраняет, таким образом, отек и гиперемия слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при рините. В

терапевтических концентрациях не раздражает слизистую оболочку, не вызывает гиперемии.

Действие наступает через несколько минут после применения и продолжается в течение 12 ч.

Стерилизованная морская вода, входящая в состав препарата Риномарис, способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости.

Микроэлементы улучшают функцию мерцательного эпителия, что позволяет снизить побочные местные реакции, такие как раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки.

#### **Фармакокинетика**

При местном применении препарат практически не абсорбируется. Концентрации активного вещества в плазме крови настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

### **Показания к применению:**

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка);
- аллергический ринит (поллиноз);
- синусит;
- евстахиит;
- средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);
- подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Насморк](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Отит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

### **Противопоказания:**

- артериальная гипертензия;
  - тахикардия;
  - выраженный атеросклероз;
  - глаукома;
  - атрофический ринит;
  - тиреотоксикоз;
  - хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);
  - детский возраст до 6 лет (для спрея назального 0.1%);
  - детский возраст до 2 лет (для спрея назального 0.05%);
  - повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- С *осторожностью* следует применять препарат при сахарном диабете, ИБС.

## **Способ применения и дозы:**

*Риномарис спрей назальный дозированный 0.05%*

**Детям в возрасте от 2 до 6 лет:** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 1-2 раза/сут.

**Детям старше 6 лет:** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 2-3 раза/сут.

*Риномарис спрей назальный дозированный 0.1%*

**Детям старше 6 лет и взрослым:** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 2-3 раза/сут.

Препарат не следует применять чаще 4 раз/сут. Продолжительность курса - не более 5-7 дней.

## **Побочное действие:**

*Со стороны дыхательной системы:* при частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чиханье, гиперсекреция, отек слизистой оболочки носа.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* ощущение сердцебиения, тахикардия, аритмии, повышение АД.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, бессонница; при длительном применении в высоких дозах - депрессия.

*Прочие:* рвота, нарушение зрения.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* усиление побочных эффектов.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода или грудного ребенка. Не допускается превышения рекомендуемых доз.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Риномарис несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Риномарис не следует применять в течение длительного времени, например, при хронических ринитах.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Ксилометазолин в дозах, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность к управлению транспортными средствами или оборудованием.

### **Применение в детском возрасте**

Риномарис спрей назальный дозированный 0.1% противопоказан у детей в возрасте до 6 лет, спрей назальный дозированный 0.05% противопоказан у детей в возрасте до 2 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

---

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rinomaris>