

Ринопронт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Карбиноксамин](#)
- [Фенилэфрин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антигистаминное, местное противовоспалительное и вазоконстрикторное действие. Уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, снижает проницаемость капилляров слизистой оболочки полости носа. За счет фенилэфрина вызывает сужение сосудов и уменьшение отека слизистой оболочки полости носа. Устраняет явления ринита, жжение в глазах, чувство тяжести в голове на 10-12 ч.

Показания к применению:

- острый ринит (вазомоторный, аллергический, инфекционно-воспалительный);
- синусит;
- сенная лихорадка.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)

- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- артериальная гипертензия;
- тиреотоксикоз;
- феохромоцитома;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капс. 2 раза/сут (утром и вечером, с интервалом в 12 ч). Капсулы проглатывают целиком, не разжевывая. В случае затруднения глотания назначают сироп.

Побочное действие:

Сухость слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита, диспепсия, нарушение зрения, головокружение, головная боль, бессонница, тревожность, заторможенность, сердцебиение, кардиалгия, повышение АД, изменение картины периферической крови, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы (у детей и лиц старческого возраста): возбуждение ЦНС.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами MAO; адреномиметическое действие усиливается на фоне гуанетидина и изобарина.

Галотан усиливает риск развития аритмии.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Данные по применению у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Rinopront>