

## Ринопронт



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Карбиноксамин](#)
- [Фенилэфрин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает антигистаминное, местное противовоспалительное и вазоконстрикторное действие. Уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, снижает проницаемость капилляров слизистой оболочки полости носа. За счет фенилэфрина вызывает сужение сосудов и уменьшение отека слизистой оболочки полости носа. Устраняет явления ринита, жжение в глазах, чувство тяжести в голове на 10-12 ч.

### **Показания к применению:**

- острый ринит (вазомоторный, аллергический, инфекционно-воспалительный);
- синусит;
- сенная лихорадка.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергия](#)
- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)

- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- артериальная гипертензия;
- тиреотоксикоз;
- феохромоцитома;
- закрытоугольная глаукома;
- гипертрофия предстательной железы;
- беременность;
- период лактации.

## **Способ применения и дозы:**

**Взрослым и детям старше 12 лет** - по 1 капс. 2 раза/сут (утром и вечером, с интервалом в 12 ч). Капсулы проглатывают целиком, не разжевывая. В случае затруднения глотания назначают сироп.

## **Побочное действие:**

Сухость слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита, диспепсия, нарушение зрения, головокружение, головная боль, бессонница, тревожность, заторможенность, сердцебиение, кардиалгия, повышение АД, изменение картины периферической крови, кожные аллергические реакции.

## **Передозировка:**

*Симптомы* (у детей и лиц старческого возраста): возбуждение ЦНС.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказания: беременность; период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Несовместим с ингибиторами MAO; адреномиметическое действие усиливается на фоне гуанетидина и изобарина.

Галотан усиливает риск развития аритмии.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

### ***Применение в детском возрасте***

Данные по применению у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rinopront>