Ринопронт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Карбиноксамин
- Фенилэфрин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антигистаминное, местное противовоспалительное и вазоконстрикторное действие. Уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, снижает проницаемость капилляров слизистой оболочки полости носа. За счет фенилэфрина вызывает сужение сосудов и уменьшение отека слизистой оболочки полости носа. Устраняет явления ринита, жжение в глазах, чувство тяжести в голове на 10-12 ч.

Показания к применению:

— острый ринит (вазомоторный, аллергический, инфекционно-воспалительный);

— синусит;

— сенная лихорадка.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Инфекции
- Лихорадка

- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— артериальная гипертензия;

— тиреотоксикоз;

— феохромоцитома;

— закрытоугольная глаукома;

— гипертрофия предстательной железы;

— беременность;

— период лактации.

Способ применения и дозы:

Взрослым и **детям старше 12 лет** - по 1 капс. 2 раза/сут (утром и вечером, с интервалом в 12 ч). Капсулы проглатывают целиком, не разжевывая. В случае затруднения глотания назначают сироп.

Побочное действие:

Сухость слизистой оболочки полости рта, снижение аппетита, диспепсия, нарушение зрения, головокружение, головная боль, бессонница, тревожность, заторможенность, сердцебиение, кардиалгия, повышение АД, изменение картины периферической крови, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы (у детей и лиц старческого возраста): возбуждение ЦНС.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами МАО; адреномиметическое действие усиливается на фоне гуанетидина и изобарина.

Галотан усиливает риск развития аритмии.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Данные по применению у детей в возрасте до 12 лет отсутствуют.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinopront