# Риностоп Экстра (капли)



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

# Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

 $\Diamond$  **Капли назальные** в виде прозрачного бесцветного или желтоватого раствора.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	0.5 мг

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат - 0.6093 мг, натрия цитрат дигидрат - 3.823 мг, глицерол - 24.348 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.1 мг, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.

10 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.

15 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.

# Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Адреномиметическое средство для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей. При закапывании в конъюнктивальный мешок уменьшает отечность конъюнктивы.

#### Фармакокинетика

Действие проявляется через 15 мин после применения и продолжается в течение 6-8 ч.

#### Показания к применению:

Затруднение носового дыхания при простудных заболеваниях, воспалении носовых пазух, евстахиите, сенной лихорадке, аллергических ринитах, застойные явления и отек конъюнктивы.

## Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Воспаление

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

- Евстахиит
- Лихорадка
- Ринит
- Сенная лихорадка

## Противопоказания:

Воспаление слизистой носовых ходов без выделения секрета, хроническая сердечная недостаточность, гипертиреоз, сахарный диабет, беременность, детский возраст до 6 лет (для глазных капель), повышенная чувствительность к оксиметазолину, атрофический ринит, период лактации, аритмии, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, ХПН, закрытоугольная глаукома.

## Способ применения и дозы:

Применяют местно.

## Побочное действие:

Со стороны дыхательной системы: возможны преходящая сухость и жжение слизистой носовых ходов, сухость во рту и горле, чиханье; при длительном применении возможно появление реактивной гиперемии слизистой, атрофия слизистой оболочки.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение; редко - артериальная гипертензия.

*Со стороны ЦНС:* повышенная возбудимость, головокружение, головная боль, нарушения сна; при длительном применении - тахифилаксия.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

*Со стороны органа зрения:* при конъюнктивальном введении возможны мидриаз, парез аккомодации, раздражение конъюнктивы и окружающих тканей, ретракция века.

#### Применение при беременности и кормлении грудью:

Оксиметазолин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном назначении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.

Оксиметазолин замедляет всасывание местноанестезирующих препаратов, удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих препаратов повышает риск развития побочных эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом можно использовать не более 3 дней. Избегать попадания препарата, предназначенного для интраназального введения, в глаза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinostop Ekstra kapli