

## [Риностоп Экстра \(капли\)](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Капли назальные** в виде прозрачного бесцветного или желтоватого раствора.

	<b>1 мл</b>
оксиметазолина гидрохлорид	0.5 мг

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат - 0.6093 мг, натрия цитрат дигидрат - 3.823 мг, глицерол - 24.348 мг, бензалкония хлорид 50% - 0.1 мг, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.  
10 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.  
15 мл - флаконы с капельницей (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Адреномиметическое средство для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей. При закапывании в конъюнктивальный мешок уменьшает отечность конъюнктивы.

#### **Фармакокинетика**

Действие проявляется через 15 мин после применения и продолжается в течение 6-8 ч.

### **Показания к применению:**

Затруднение носового дыхания при простудных заболеваниях, воспалении носовых пазух, евстахиите, сенной лихорадке, аллергических ринитах, застойные явления и отек конъюнктивы.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Воспаление](#)

- [Евстахиит](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)

### Противопоказания:

Воспаление слизистой носовых ходов без выделения секрета, хроническая сердечная недостаточность, гипертиреоз, сахарный диабет, беременность, детский возраст до 6 лет (для глазных капель), повышенная чувствительность к оксиметазолину, атрофический ринит, период лактации, аритмии, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, ХПН, закрытоугольная глаукома.

### Способ применения и дозы:

Применяют местно.

### Побочное действие:

*Со стороны дыхательной системы:* возможны преходящая сухость и жжение слизистой носовых ходов, сухость во рту и горле, чиханье; при длительном применении возможно появление реактивной гиперемии слизистой, атрофия слизистой оболочки.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* сердцебиение; редко - артериальная гипертензия.

*Со стороны ЦНС:* повышенная возбудимость, головокружение, головная боль, нарушения сна; при длительном применении - тахифилаксия.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота.

*Со стороны органа зрения:* при конъюнктивальном введении возможны мидриаз, парез аккомодации, раздражение конъюнктивы и окружающих тканей, ретракция века.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Оксиметазолин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном назначении ингибиторов MAO и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.

Оксиметазолин замедляет всасывание местноанестезирующих препаратов, удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих препаратов повышает риск развития побочных эффектов.

### Особые указания и меры предосторожности:

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом можно использовать не более 3 дней. Избегать попадания препарата, предназначенного для интраназального введения, в глаза.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Rinostop\\_Ekstra\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Rinostop_Ekstra_kapli)