Ринза Лорсепт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Амилметакрезол
- Дихлорбензиловый спирт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки для рассасывания (апельсиновые)*** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло апельсина, масло семян аниса, масло листьев мяты полевой, краситель солнечный закат желтый.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки для рассасывания (лимонные)*** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло семян аниса, масло листьев мяты полевой, концентрат масла лимона, краситель хинолиновый желтый.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)*** от коричневато-желтого до коричневого цвета, круглые,

двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, масло листьев мяты полевой, масло лимона, ароматизатор медовый, краситель карамель, краситель солнечный закат желтый.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки для рассасывания (черносмородиновые)*** фиолетового цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло листьев мяты полевой, ароматизатор черносмородиновый, краситель азорубин, краситель бриллиантовый голубой.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;

— детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Местно. Взрослые и дети старше 6 лет: рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 ч. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Таблетку следует медленно рассасывать до полного растворения. Продолжительность курса лечения - 5-7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (чувство жжения в ротовой полости). В случае появления реакций, не описанных в инструкции по применению, следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего, применения препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно по показаниям под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать указанные дозы.

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ). Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер.

Влияние на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinza_Lorsept