

Ринза Лорсепт



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания (апельсиновые)** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло апельсина, масло семян аниса, масло листьев мяты полевой, краситель солнечный закат желтый.

- 4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (лимонные)** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло семян аниса, масло листьев мяты полевой, концентрат масла лимона, краситель хинолиновый желтый.

- 4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)** от коричневатого-желтого до коричневого цвета, круглые,

Ринза Лорсепт

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

двойковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, масло листьев мяты полевой, масло лимона, ароматизатор медовый, краситель карамель, краситель солнечный закат желтый.

- 4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (черносмородиновые)** фиолетового цвета, круглые, двойковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, декстроза, лимонной кислоты моногидрат, масло листьев мяты полевой, ароматизатор черносмородиновый, краситель азорубин, краситель бриллиантовый голубой.

- 4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пакеты многослойные ламинированные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Местно. Взрослые и дети старше 6 лет: рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 ч. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Таблетку следует медленно рассасывать до полного растворения. Продолжительность курса лечения - 5-7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (чувство жжения в ротовой полости). В случае появления реакций, не описанных в инструкции по применению, следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего, применения препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно по показаниям под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать указанные дозы.

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ). Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности - не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер.

Влияние на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinza_Lorsept