Ринза Лорсепт Анестетикс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

◊ Таблетки для рассасывания (апельсиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (3) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (4) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пачки картонные.

<u>◊ Таблетки для рассасывания</u> (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

⁸ шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (3) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (4) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пачки картонные.

◊ Таблетки для рассасывания (медово-лимонные).

<i>у таолетки для рассасывания</i> (медово-лимонные).	
	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (3) пачки картонные.

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

- 4 шт. стрипы (4) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пачки картонные.

◊ Таблетки для рассасывания (черносмородиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (2) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (3) пачки картонные.
- 4 шт. стрипы (4) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пакеты из алюминиевой фольги (1) пачки картонные.
- 8 шт. упаковки ячейковые контурные (3) пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro, обладает антимикотическим действием. Оказывает местноанестезирующее и противоотечное действие.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия болей в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

Относится к болезням:

• Инфекции

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. **Взрослые и дети старше 12 лет:** рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Продолжительность курса лечения 5-7 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Возможна потеря чувствительности языка (соблюдать осторожностъ при приеме горячей пищи и воды).

Передозировка:

Возможна избыточная анестезия слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно под контролем врача только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (XE).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 30°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinza_Lorsept_Anestetiks