

Ринза Лорсепт Анестетикс



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки для рассасывания** (апельсиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (3) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (апельсиновые, лимонные, медово-лимонные, черносмородиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (лимонные).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (3) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (медово-лимонные).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (3) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

♦ **Таблетки для рассасывания** (черносмородиновые).

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг
лидокаина гидрохлорида моногидрат	10 мг

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (2) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (3) - пачки картонные.

4 шт. - стрипы (4) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пакеты из алюминиевой фольги (1) - пачки картонные.

8 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, обладает антимикотическим действием. Оказывает местноанестезирующее и противоотечное действие.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия болей в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. **Взрослые и дети старше 12 лет:** рассасывать по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Продолжительность курса лечения 5-7 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Возможна потеря чувствительности языка (соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды).

Передозировка:

Возможна избыточная анестезия слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно под контролем врача только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка содержит 0.20 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 30°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rinza_Lorsept_Anestetiks