Родиолы экстракт жидкий



Код АТХ:

- A13A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Родиолы розовой корневища с корнями

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Экстракт оказывает общетонизирующее действие. Повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, таким как загрязнение окружающей среды, воздействие патогенной микрофлоры и вирусов, воздействие высоких и низких температур. Повышает физическую и умственную работоспособность.

Показания к применению:

— астения;

— повышеная утомляемость;

— нейро-циркуляторная дистония по гипотоническому типу;

— неврастенические состояния;

— реконвалесценция (после инфекционных и тяжелых соматических заболеваний);

— умственное и физическое перенапряжение (операторская деятельность, работа в экстремальных условиях);

— ОРВИ (профилактика в период эпидемий).

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Гипотония
- Инфекции
- Неврит
- Реконвалесценция

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— возбуждение;

— бессонница;

— артериальная гипертензия;

— лихорадочный синдром;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: алкоголизм, ЧМТ, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** и **детям с 12 лет** в первой половине дня, за 15-30 мин до еды. В виде жидкого экстракта - по 5-10 кап 2-3 раза/сут, в течение 10-20 дней; в психоневрологической практике - до 2 мес, начиная с 10 кап 2-3 раза/сут и постепенно увеличивая до 30-40 кап.

Побочное действие:

Раздражительность, бессонница, головная боль; аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие стимуляторов ЦНС, является антагонистом лекарственных средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. нейролептиков (хлорпромазин), барбитуратов, анксиолитиков, противоэпилептических средств).

Особые указания и меры предосторожности:

Не принимать во второй половине дня.

Максимальная разовая доза экстракта жидкого содержит 0.63 г, суточная - 1.9 г абсолютного спирта.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: детский возраст старше 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rodioly_ekstrakt_zhidkiy