

## Ромазулан



### Код АТХ:

- [A01AB11](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ромашки аптечной цветков экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения** в виде прозрачной жидкости коричнево-зеленоватого цвета, с характерным запахом аптечной ромашки и спирта; возможно образование осадка в процессе хранения.

	<b>100 г</b>
жидкий экстракт ромашки аптечной (44:100)	95.881 г
Гвайазулен	37 мг

*Экстрагент:* этанол 50%, аммиака раствор концентрированный (до pH 8.0-8.5).

*Вспомогательные вещества:* полисорбат 80 (твин 80).

50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное действие, а также спазмолитическое, ветрогонное и некоторое противомикробное действие.

### Показания к применению:

## Ромазулан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Внутрь:* в комплексной терапии гастрита, дуоденита, колита, метеоризма.

*Наружно:* при воспалительных заболеваниях кожи (трещины, укусы насекомых).

*Местно:* при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и глотки, вагинитах.

### Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Гастрит](#)
- [Дуоденит](#)
- [Колит](#)
- [Метеоризм](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При приеме внутрь:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

### Способ применения и дозы:

Внутрь, при *желудочно-кишечных заболеваниях* препарат принимают в разведенном виде по 1/2 ч. ложки на стакан (200 мл) теплой воды 2-3 раза/сут. Курс лечения - 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Наружно (повязки, промывания, компрессы) и местно (в виде клизм, полосканий, влагалищных спринцеваний) препарат применяют в разведенном виде - 1/2 столовой ложки на 1 л воды.

### Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции.

### Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан для приема внутрь при беременности и в период лактации.

### Особые указания и меры предосторожности:

#### *Применение в детском возрасте*

Противопоказан детям до 12 лет.

### Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 8° до 15°C.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Romazulan>