

Ромазулан



Код АТХ:

- [A01AB11](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ромашки аптечной цветков экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения** в виде прозрачной жидкости коричнево-зеленоватого цвета, с характерным запахом аптечной ромашки и спирта; возможно образование осадка в процессе хранения.

	100 г
жидкий экстракт ромашки аптечной (44:100)	95.881 г
Гвайазулен	37 мг

Экстрагент: этанол 50%, аммиака раствор концентрированный (до pH 8.0-8.5).

Вспомогательные вещества: полисорбат 80 (твин 80).

50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает противовоспалительное действие, а также спазмолитическое, ветрогонное и некоторое противомикробное действие.

Показания к применению:

Ромазулан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Внутрь: в комплексной терапии гастрита, дуоденита, колита, метеоризма.

Наружно: при воспалительных заболеваниях кожи (трещины, укусы насекомых).

Местно: при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и глотки, вагинитах.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Гастрит](#)
- [Дуоденит](#)
- [Колит](#)
- [Метеоризм](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

При приеме внутрь:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, при *желудочно-кишечных заболеваниях* препарат принимают в разведенном виде по 1/2 ч. ложки на стакан (200 мл) теплой воды 2-3 раза/сут. Курс лечения - 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Наружно (повязки, промывания, компрессы) и местно (в виде клизм, полосканий, влагалищных спринцеваний) препарат применяют в разведенном виде - 1/2 столовой ложки на 1 л воды.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан для приема внутрь при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 8° до 15°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Romazulan>