

[Ромфалак](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лактулоза](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** прозрачный, слегка вязкий, без видимых частиц, со сладким вкусом.

	100 мл
лактuloза	66.7 г

270 г (200 мл) - флаконы полиэтиленовые (1) в комплекте с мерной 2-сторонней ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает гиперосмотическое, гипоаммониемическое, слабительное действие, стимулирует перистальтику кишечника, улучшает всасывание фосфатов и солей кальция. Под влиянием препарата происходит изменение флоры толстого кишечника (увеличение количества лактобацилл), что приводит к повышению кислотности в просвете толстого

кишечника и стимулирует перистальтику. Наряду с этим увеличивается объем и происходит размягчение каловых масс. В результате препарат оказывает слабительный эффект, не влияя при этом непосредственно на слизистую оболочку и гладкую мускулатуру толстого кишечника. Под действием препарата происходит миграция аммиака из крови в кишечник, уменьшение образования азотсодержащих токсических веществ в его проксимальном отделе и, соответственно, всасывание их в систему полйвены.

Действие наступает через 24-48 ч после приема (отсроченность обусловлена прохождением препарата через ЖКТ).

Обладает способностью ингибировать рост сальмонелл в толстом кишечнике. Не уменьшает абсорбцию витаминов и не вызывает привыкания.

Фармакокинетика

Абсорбция - низкая, выводится через кишечник в неизменном виде (выведение почками 3%).

Показания к применению:

— хронический запор;

Ромфалак

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- регулирование стула при геморрое, необходимости хирургической операции на толстой кишке и в области анального отверстия, в послеоперационном периоде;
- печеночная прекома и кома;
- печеночная энцефалопатия;
- гипераммониемия;
- дисбактериоз;
- сальмонеллез (за исключением генерализованных форм);
- синдром гнилосной диспепсии у детей раннего возраста в результате пищевых отравлений.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Диспепсия](#)
- [Запор](#)
- [Кома](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- непереносимость галактозы или фруктозы;
 - галактоземия;
 - непроходимость кишечника;
 - подозрение на аппендицит;
 - ректальные кровотечения;
 - коло-, илеостома;
 - повышенная чувствительность.
- С осторожностью - сахарный диабет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды.

Дозу препарата подбирают индивидуально.

Пациенты	Начальная доза (3 дня)	Продолжение лечения
Взрослые	15-45 мл сиропа (1-3 ст. ложки)	15-30 мл сиропа (1-2 ст. ложки)
Дети от 7 до 14 лет	15 мл сиропа (1 ст. ложка)	10 мл сиропа (2 ч. ложки)
Дети от 1 года до 6 лет	5-10 мл сиропа (1-2 ч. ложки)	5-10 мл сиропа (1-2 ч. ложки)
Грудные дети	5 мл сиропа (1 ч. ложка)	5 мл сиропа (1 ч. ложка)

Как правило, доза может быть снижена после 2 дней приема в зависимости от потребности больного. Препарат лучше принимать 1 раз/сут утром во время еды. Дозу увеличивают в том случае, если в течение 2 дней приема препарата не наблюдается улучшения состояния больного.

При запорах: **взрослые** - в первые 3 дня по 15-40 мл/сут, затем - по 10-25 мл. **Детям старше 6 лет** - в первые 3 дня по 15 мл/сут, затем - по 10 мл; **1-6 лет** - по 5-10 мл/сут, **до 1 года** - 5 мл/сут. Продолжительность лечения - от 4 недель до 3-4 месяцев.

При лечении печеночной комы, прекомы и энцефалопатии: начальная доза - 3 раза/сут по 30-60 мл. Затем переходят

Ромфалак

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

на индивидуально подобранную поддерживающую дозу так, чтобы мягкий стул был максимум 2-3 раза/сут. Лечение может продолжаться до 3-х месяцев и больше.

При *дисбактериозе и сальмонеллезе*: **взрослые** - по 15-30 мл 3-5 раз/сут, **дети старше 8 лет** - 45 мл/сут, **от 5 до 8 лет** - 25 мл/сут, **от 1 до 5 лет** - 15 мл/сут, **до 1 года** - 5-15 мл/сут. Продолжительность лечения - 10-12 дней, повторные курсы- 3 раза с недельными перерывами.

В *послеоперационном периоде*: **взрослые** - по 10-30 мл 3 раза/сут, **дети старше 1 года** - по 5-10 мл 2-3 раза/сут, **до 1 года** - по 5 мл 2-3 раза/сут. Препарат назначают через 18-24 ч после операции в течение 3-5 дней.

Побочное действие:

Судороги, метеоризм, тошнота, диарея, головная боль, головокружение, аритмии, миалгия, повышенная утомляемость, слабость.

При *длительном лечении* - нарушение водно-электролитного обмена.

Передозировка:

Симптомы: боли в животе, тошнота, диарея, потеря электролитов.

Лечение: прекращение приема препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Ромфалак можно применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Антибиотики и антациды снижают эффект применения Ромфалака.

Изменяет pH-зависимое высвобождение кишечнорастворимых лекарственных средств.

Не рекомендуется принимать Ромфалак в течение 2 ч после приема других лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении препарата (более 6 месяцев) следует регулярно контролировать уровень калия, хлора и углекислого газа в плазме крови.

При гастрокардиальном синдроме следует постепенно увеличивать дозы, чтобы избежать метеоризма (который исчезает самостоятельно на 2-3 день лечения).

У пожилых и ослабленных больных, принимающих Ромфалак более 6 месяцев, рекомендуется периодически измерять уровень электролитов в сыворотке крови.

При появлении диареи лечение отменяют.

Если запор сохраняется в течение нескольких дней приема препарата или при возобновлении запора после прекращения приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

Применение в пожилом возрасте

У пожилых и ослабленных больных, принимающих Ромфалак более 6 месяцев, рекомендуется периодически измерять уровень электролитов в сыворотке крови.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Romfalak>