# Ропрен




## Код АТХ:

- A05BA

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ропрен

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

Капли для приема внутрь во флаконах темного стекла (с крышкой-капельницей) по 4 или 8 г; в пачке картонной 1 флакон.

## Состав:

**100 г капель для приема внутрь содержат:**

*Активное вещество:* продукт переработки древесной зелени ели европейской — ропрен (с содержанием суммы полипренолов 95%) 25 г

*Вспомогательные вещества:* масло подсолнечное рафинированное дезодорированное (до 100 г).

## Описание:

Капли для приема внутрь прозрачные, маслянистые, от желтого до желтовато-оранжевого цвета.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат растительного происхождения. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое действие. Нормализует процессы окислительного фосфорилирования на уровне клеточного метаболизма. Способствует восстановлению мембран гепатоцитов путем конкурентного ингибирования перекисных процессов.

В печени преобразуется в долихол, участвующий в гликозилировании мембранных белков и образовании гликопротеинов. Нормализует дезинтоксикационную функцию печени.

***Фармакокинетика***
Ропрен видоизменяется клетками печени до активных форм. До 45% поглощенной дозы обнаружено в виде насыщенной формы и до 15% в виде фосфорилированной формы (долихолфосфата).
— Максимальный уровень концентрации (в пределах 4 мкг/мл) в крови достигается через 3 часа;
— Общее среднее время присутствия в организме - 11 часов;
— Период полувыведения из организма T1/2 составляет 10 часов;
— Величина кажущегося стационарного объема распределения составляет 42 46 л/кг, препарат эффективно проникает в органы и ткани;
— Общая абсолютная биодоступность препарата в крови составляет 75,2%.

## Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

— жировая дистрофия печени различной этиологии;

— гепатит;

— цирроз печени (в комплексной терапии);

— токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные).

## Относится к болезням:

- Гепатит
- Жировая дистрофия печени
- Токсическое повреждение печени
- Цирроз печени

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— беременность (исследования не проводились);

— период лактации (исследования не проводились);

— детский возраст (исследования не проводились);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь во время еды по 3 капли 3 раза/сут. Курс лечения - 3 месяца.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

## Передозировка:

При значительном превышении дозы (4 мл на прием) отмечалось слабое слабительное действие.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с тем, что исследования по безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводились, Ропрен не следует назначать беременным и кормящим женщинам.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Ропрен с другими лекарственными средствами не установлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать Ропрен после приёма алкоголя или назначать пациентам, которые страдают неуправляемой зависимостью от алкоголя.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 10°C.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ropren