

Ропрен



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ропрен](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь во флаконах темного стекла (с крышкой-капельницей) по 4 или 8 г; в пачке картонной 1 флакон.

Состав:

100 г каплей для приема внутрь содержат:

Активное вещество: продукт переработки древесной зелени ели европейской — ропрен (с содержанием суммы полипренолов 95%) 25 г

Вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное (до 100 г).

Описание:

Капли для приема внутрь прозрачные, маслянистые, от желтого до желтовато-оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое действие. Нормализует процессы окислительного фосфорилирования на уровне клеточного метаболизма. Способствует восстановлению мембран гепатоцитов путем конкурентного ингибирования перекисных процессов.

В печени преобразуется в долихол, участвующий в гликозилировании мембранных белков и образовании гликопротеинов. Нормализует дезинтоксикационную функцию печени.

Фармакокинетика

Ропрен видоизменяется клетками печени до активных форм. До 45% поглощенной дозы обнаружено в виде насыщенной формы и до 15% в виде фосфорилированной формы (долихолфосфата).

- Максимальный уровень концентрации (в пределах 4 мкг/мл) в крови достигается через 3 часа;
- Общее среднее время присутствия в организме - 11 часов;
- Период полувыведения из организма T_{1/2} составляет 10 часов;
- Величина кажущегося стационарного объема распределения составляет 42 46 л/кг, препарат эффективно проникает в органы и ткани;
- Общая абсолютная биодоступность препарата в крови составляет 75,2%.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- гепатит;
- цирроз печени (в комплексной терапии);
- токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные).

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Жировая дистрофия печени](#)
- [Токсическое повреждение печени](#)
- [Цирроз печени](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- беременность (исследования не проводились);
- период лактации (исследования не проводились);
- детский возраст (исследования не проводились);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь во время еды по 3 капли 3 раза/сут. Курс лечения - 3 месяца.

Побочное действие:

Ропрен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

При значительном превышении дозы (4 мл на прием) отмечалось слабое слабительное действие.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с тем, что исследования по безопасности применения препарата при беременности и в период лактации не проводились, Ропрен не следует назначать беременным и кормящим женщинам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Ропрен с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется принимать Ропрен после приёма алкоголя или назначать пациентам, которые страдают неуправляемой зависимостью от алкоголя.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 10°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ropren>