Ротокан-ВИЛАР



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Календулы лекарственной цветков экстракт
- Ромашки аптечной цветков экстракт
- Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий***	**1 л**
цветки календулы лекарственной	250 г
цветки ромашки аптечной	500 г
трава тысячелистника обыкновенного	250 г

25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

РОТОКАН-ВИЛАР оказывает местное противовоспалительное действие, обладает гемостатическими и спазмолитическими свойствами.

Показания к применению:

В стоматологии РОТОКАН-ВИЛАР применяют у взрослых при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта, таких как афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит.

В гастроэнтерологии РОТОКАН-ВИЛАР применяют в комплексном лечении гастродуоденитов, хронических энтеритов и колитов.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Гастроэнтерит
- Гингивит
- Колит
- Пародонтит
- Стоматит
- Энтерит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек, нарушения функции печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

С осторожностью. При приеме внутрь - нарушения функции почек легкой и средней тяжести; гломерулонефрит, пиелонефрит.

Способ применения и дозы:

Местно, внутрь, ректально.

РОТОКАН-ВИЛАР применяют в виде водного раствора, который готовят перед применением путем добавления 1 чайной ложки препарата на стакан теплой кипяченой воды. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 3 чайных ложек на стакан воды. В стоматологии лечение пародонта проводят после удаления зубных отложений и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 мин тонкие турунды, обильно смоченные раствором препарата. Процедуру проводят 1 раз в сут ежедневно или через день, всего 4-6 раз. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор препарата применяют путем аппликаций (15-20 мин) или ротовых полосканий (1-2 мин) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней.

В гастроэнтерологии РОТОКАН-ВИЛАР применяют внутрь и в микроклизмах. Внутрь применяют по 1/3-1/2 стакана раствора за 30 мин до еды или через 40-60 мин после еды 3-4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели.

Микроклизмы с 50-100 мл раствора препарата применяют после очистительной клизмы 1-2 раза в сут. Курс лечения 3-6 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не поступало.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

В составе препарата содержится не менее 33% этилового спирта.

В максимальной суточной дозе водного раствора, полученного путем добавления 1 чайной ложки препарата на стакан теплой кипяченой воды, содержание абсолютного этилового спирта составляет около 3.2 г.

В максимальной суточной дозе водного раствора, полученного путем добавления 3 чайных ложек препарата на стакан теплой кипяченой воды, содержание абсолютного этилового спирта составляет около 9.5 г.

При применении препарата следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.

С осторожностью: при приеме внутрь - нарушения функции почек легкой и средней тяжести; гломерулонефрит, пиелонефрит.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушениях функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rotokan-Vilar