

[Рулид](#)



Код АТХ:

- [J01FA06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Рокситромицин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой "164" на одной стороне; вид на поперечном разрезе: белого цвета.

	1 таб.
рокситромицин	150 мг

Вспомогательные вещества: гипролоза - 19.65 мг, полоксамер - 150 мкг, повидон К30 - 4.2 мг, кремния диоксид коллоидный - 1.875 мг, магния стеарат - 1.875 мг, тальк - 2.25 мг, крахмал кукурузный - до 210 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 2.78 мг, декстроза - 1.12 мг, титана диоксид - 270 мкг, пропиленгликоль - 830 мкг.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное, противопротозойное.

Блокирует 50S субъединицу рибосомальной мембраны, останавливая синтез белка..

Фармакодинамика

Эффективно действует на стрептококки группы А и В, *Neisseria meningitidis*, *Branhamella catarrhalis*, *Borrelia burgdorferi*, *Bordetella pertussis*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Clostridium* spp., *Clostridium perfringens*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Enterococcus* spp., *Methi-S-Staphylococcus*, *Helicobacter pylori*, *Peptostreptococcus* spp., *Porphyromonas* spp., *Propionibacterium acnes*, *Rhodococcus equi*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Chlamydia trachomatis*, *C.pneumoniae* и *C.psittaci*, *Legionella pneumophila*, *Campylobacter* spp., *Gardnerella vaginalis*. Умеренно чувствительны *Haemophilus influenzae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Bacteroides fragilis* и *Vibrio cholerae*.

Показания к применению:

- инфекции верхних дыхательных путей: острые фарингиты, тонзиллиты, синуситы;
- инфекции нижних дыхательных путей: пневмония (в т.ч. вызванная такими атипичными возбудителями, как *Chlamydia psittaci*, *Chlamydia pneumonia*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*, *Legionella pneumophila* и др.), бронхит, бактериальные инфекции при хронических обструктивных заболеваниях легких;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- генитальные инфекции (кроме гонореи), включая уретриты, цервико-вагиниты;
- инфекции в одонтологии.

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Вагинит](#)
- [Гонорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Уретрит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- одновременный прием препаратов типа эрготамина и дигидроэрготамина;
- повышенная чувствительность к макролидам.

Совместное применение с производными эрготамина и эрготаминоподобными сосудосуживающими средствами не допускается, так как может привести к развитию "эрготизма" и некрозу тканей конечностей.

С *осторожностью* применять у больных с тяжелой печеночной недостаточностью.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают 150 мг рокситромицина внутрь с интервалом в 12 ч. При этом суточная доза составляет 300 мг. Возможно назначение 300 мг однократно в сутки.

Детям (масса тела свыше 40 кг) назначают 150 мг рокситромицина внутрь с интервалом в 12 ч. Суточная доза составляет 300 мг.

Данная лекарственная форма не применяется у детей младше 4 лет!

У **пожилых** больных дозировка и суточная доза рокситромицина не изменяется.

При наличии **почечной недостаточности** рокситромицин назначается в дозе 150 мг 2 раза/сут.

У больных с **печеночной недостаточностью** 150 мг назначается однократно.

Длительность приема рокситромицина зависит от показания к применению, тяжести инфекционного процесса и активности возбудителя.

Рокситромицин принимается до приема пищи перорально 1 или 2 раза/сут.

Таблетка должна запиваться достаточным количеством воды.

Побочное действие:

Анафилактические реакции: ангионевротический отек, бронхоспазм, слабость, редко анафилактический шок.

Кожные реакции: сыпь, покраснение, уртикарии.

Желудочно-кишечные реакции: тошнота, рвота, боли в животе, диарея (очень редко с кровью).

Реакции со стороны печени: повышение печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ). Холестатический или гепатоцеллюлярный острый гепатит.

Возможны небольшие изменения вкусовых и обонятельных ощущений.

В отдельных случаях наблюдались симптомы панкреатита.

Головокружение, головная боль, парестезии.

Возможно развитие суперинфекции ввиду роста нечувствительных микроорганизмов.

Передозировка:

При передозировке необходимо промывание желудка и симптоматическая терапия. Специфического антидота не существует.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Рокситромицин противопоказан при беременности. Небольшие количества рокситромицина проникают в грудное молоко, поэтому необходимо прекратить кормление грудью или прием препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием *терфенадина*, ввиду повышения концентрации последнего при одновременном приеме макролидных антибиотиков, что может приводить к развитию тяжелых желудочковых аритмий. Хотя данное осложнение не было отмечено у рокситромицина, и в исследованиях на добровольцах не было показано каких-либо фармакокинетических взаимодействий или изменений на ЭКГ, не рекомендуется сочетание рокситромицина и *терфенадина*.

Прием таких препаратов, как *астемизол*, *цизаприд*, *пимозид* может приводить к удлинению интервала QT и/или тяжелым аритмиям сердца, в результате увеличения их сывороточной концентрации, в результате конкурентного влияния за изофермент CYP 3A между вышеназванными препаратами и макролидными антибиотиками.

Взаимодействие с *варфарином*, *карбамазепином*, *ранитидином*, *антацидами* и *оральными контрацептивами* отсутствует.

При одновременном назначении рокситромицина с антагонистами витамина К рекомендуется следить за протромбиновым временем или международным нормализованным отношением (INR).

Рокситромицин может замещать протеин связанный дизопирамид, приводя к повышению сывороточного уровня дизопирамида. Рекомендовано мониторирование ЭКГ и, по возможности, определение уровня дизопирамида в сыворотке.

При одновременном приеме с *дигоксином* возможно увеличение абсорбции последнего. Рекомендуется следить за электрокардиограммой и сывороточным уровнем сердечного гликозида. Это обязательно при появлении симптомов передозировки сердечных гликозидов.

Рокситромицин может увеличивать период полувыведения мидазолама, приводя к усилению и удлинению его действия.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата больным с печеночной недостаточностью необходима особая осторожность, контроль за функцией печени и корректировка дозы.

При назначении препарата больным с почечной недостаточностью, а также больным пожилого возраста, необходимости в корректировке дозы не возникает.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Rulid>