

## [Румалон](#)



### **Код АТХ:**

- [M09AX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гликозаминогликан-пептидный комплекс](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Препарат оказывает влияние на обмен веществ в хрящевой гиалиновой ткани: усиливает биосинтез сульфатированных мукополисахаридов, стимулирует регенерацию суставного хряща и тормозит катаболические процессы в хрящевой ткани.

### **Показания к применению:**

Дегенеративные изменения суставов:

- гонартроз;
- артроз межпальцевых суставов;

## Румалон

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- коксартроз;
- спондилез;
- спондилоартроз;
- менископатия;
- хондромалация надколенника.

### Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Хондрома](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- ревматоидный артрит.

### Способ применения и дозы:

Препарат вводят глубоко в/м: в первый день - 0.3 мл, во второй день - 0.5 мл, далее - по 1 мл 3 раза в неделю в течение 5-6 недель.

Возможно повторение курса лечения по той же схеме.

### Побочное действие:

*Редко* - аллергические реакции.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Rumalon>