

[Рутацид](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидроталцит](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки жевательные	1 таб.
Гидроталцит	500 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, натрия сахаринат, карбоксиметилкрахмал натрия, тальк, магния стеарат, ароматизатор мятный.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гидроталцит имеет слоисто-сетчатую структуру с низким содержанием алюминия и магния. Высвобождение ионов алюминия и магния происходит постепенно в зависимости от pH желудочного сока. Препарат обеспечивает быструю и продолжительную нейтрализацию соляной кислоты с поддержанием pH близким к нормальному уровню. Оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка. Уменьшает протеолитическую активность пепсина, связывает желчные кислоты.

Фармакокинетика

Высвобождение ионов магния и алюминия происходит в желудке постепенно, в зависимости от величины pH. Всасывается гидроталцит в тонкой кишке. После приема внутрь содержание ионов магния и алюминия в плазме крови временно повышается, но проникновения в нервную и костную ткани не происходит (при нормальной функции

почек). Абсорбированная часть выводится почками.

Показания к применению:

- гиперацидность желудочного сока;
- изжога;
- гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- рефлюкс-эзофагит.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст (до 6 лет).

С осторожностью: хроническая почечная недостаточность, гипофосфатемия.

Способ применения и дозы:

Внутрь, тщательно разжевывая.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1-2 таблетки через 1ч после еды 3-4 раза в сутки и перед сном.

Дети от 6 до 12 лет: по 1 таблетке 2 раза в сутки. Лечение следует продолжать в течение 4 недель

Побочное действие:

При применении препарата Рутацид в рекомендуемых дозах нежелательные эффекты возникают редко.

Возможны аллергические реакции, диарея, отрыжка.

Передозировка:

О признаках интоксикации вследствие передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Подтвержденных данных о нежелательном действии гидроталцита в период беременности и грудного вскармливания нет.

Применение препарата Рутацид во время беременности разрешен в случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

Препарат Рутацид не проникает в грудное молоко, поэтому его применение возможно в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Как и другие антациды, Рутацид может уменьшать всасывание тетрациклинов, хинолонов (ципрофлоксацина, офлоксацина), препаратов железа и кумаринов, антибиотиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между применением препарата Рутацид и других лекарственных средств должен составлять не менее 1 -2 ч.

Не рекомендуется применение препарата Рутацид одновременно с кислотосодержащими напитками (соки, вино).

Препарат Рутацид не содержит сахарозу, поэтому его могут принимать пациенты с сахарным диабетом.

Полиолы (маннитол) могут вызывать диарею.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат Рутацид не влияет на способность к управлению автотранспортом и другими сложными техническими устройствами, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Применение с осторожностью при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Дети старше 12 лет: по 1-2 таблетки через 1ч после еды 3-4 раза в сутки и перед сном.

Дети от 6 до 12 лет: по 1 таблетке 2 раза в сутки. Лечение следует продолжать в течение 4 недель.

Противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Rutacid>