

Рузам



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для п/к введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости с легким запахом фенола.

	1 фл.
экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка (<i>Staphylococcus aureus</i> , штамм С-2)	0.2 мл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (р-р д/инъекций 0.9%), фенол (0.025-0.05%).

0.2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

0.2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Раствор для п/к введения в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости с легким запахом фенола.

	1 фл.
экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка (<i>Staphylococcus aureus</i> , штамм С-2)	0.5 мл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (р-р д/инъекций 0.9%), фенол (0.025-0.05%).

0.5 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

0.5 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуноотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Уменьшает отёк слизистых оболочек и кожи,

снижает содержание эозинофилов и дегранулированных тучных клеток в очаге воспаления и повышает концентрацию секреторного иммуноглобулина класса А в слизистых оболочках, увеличивает тем самым сопротивляемость их к инфекции. Снижает содержание маркёров аллергического воспаления: общего иммуноглобулина класса Е в крови и оксида азота в выдыхаемом воздухе.

Показания к применению:

Сезонные (поллинозы) и круглогодичные аллергические риниты, бронхиальная астма, крапивница и отёк Квинке, атопический и другие аллергические дерматиты, частые респираторные инфекции.

Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Астма](#)
- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Крапивница](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 4 лет, острая инфекция, туберкулез в активной форме, декомпенсированные заболевания внутренних органов.

С осторожностью. С осторожностью следует применять при наличии очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, синусит) из-за возможности их обострения.

Способ применения и дозы:

Подкожно **взрослым** и **детям старше 6 лет** по 0.2 мл 1 раз в неделю, **детям от 4 до 6 лет** по 0.1 мл 1 раз в неделю; курс 5-10 недель. В течение года может быть проведено от 1 до 4 курсов. При поллинозе препарат вводится за 6-8 недель до периода цветения аллергенного растения; при частых респираторных инфекциях профилактику следует проводить весной и осенью.

Побочное действие:

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабость, обострение хронического очага инфекции, кратковременное усиление кашля при хроническом бронхите, усиление высыпаний на коже при кожной аллергии. Эти симптомы, как правило, слабо выражены и преходящи, не требуют отмены препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия препарата РУЗАМ с другими лекарственными средствами не зарегистрировано. РУЗАМ может быть назначен вместе с антигистаминными, глюкокортикостероидными препаратами или антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакции (управление автомобилем и др.).

Оставшийся в ампуле раствор не использовать.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 4 лет.

Условия хранения:

Препарата хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 4 до 20°C

Срок годности - 4 года, не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ruzam>