

[Рузам \(капли\)](#)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для подкожного введения. В ампулах из бесцветного или светозащищенного стекла, 0,2 или 0,5 мл. 5 амп. в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные упаковки с ножом или скарификатором ампульным (или без них) в пачке из картона.

Состав:

Раствор для подкожного введения	1 амп.
<i>активное вещество:</i>	
экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка (<i>Staphylococcus aureus</i> , штамм С-2)	
<i>вспомогательные вещества:</i> раствор хлорида натрия для инъекций 0,9%; фенол 0,025–0,05%	

Описание:

Раствор: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость с легким запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противоаллергическое, противовоспалительное.

Фармакодинамика

Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Уменьшает отек слизистых оболочек и кожи, снижает содержание эозинофилов и дегранулированных тучных клеток в очаге воспаления и повышает концентрацию секреторного Ig класса А в слизистых оболочках, увеличивает тем самым сопротивляемость их к инфекции. Снижает содержание маркеров аллергического воспаления: общего Ig класса Е в крови и оксида азота в выдыхаемом воздухе.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к препарату;

острая инфекция;

туберкулез в активной форме;

декомпенсированные заболевания внутренних органов;

беременность;

период грудного вскармливания;

детский возраст до 4 лет.

С осторожностью: наличие очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, синусит) из-за возможности их обострения.

Способ применения и дозы:

П/к.

Детям от 4 до 6 лет — по 0,1 мл 1 раз в неделю; взрослым и детям старше 6 лет — по 0,2 мл 1 раз в неделю, курс — 5-10 нед. В течение года может быть проведено от 1 до 4 курсов. При поллинозе препарат вводится за 6-8 нед до периода цветения аллергенного растения; при частых респираторных инфекциях профилактику следует проводить весной и осенью.

Побочное действие:

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабость, обострение хронического очага инфекции, кратковременное усиление кашля при хроническом бронхите, усиление высыпаний на коже при кожной аллергии. Эти симптомы, как правило, слабо выражены и преходящи, не требуют отмены препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие препарата Рузам® с другими ЛС не зарегистрировано. Рузам® может быть назначен вместе с антигистаминными препаратами, ГКС или антибиотиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Оставшийся в ампуле раствор не использовать.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Препарат не оказывает

Рузам (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (в т.ч. управление автомобилем).

Источник: http://drugs.thead.ru/Ruzam_kapli