

## [Рузам \(капли\)](#)



### Код АТХ:

- [L03AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

*Раствор для подкожного введения.* В ампулах из бесцветного или светозащищенного стекла, 0,2 или 0,5 мл. 5 амп. в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные упаковки с ножом или скарификатором ампульным (или без них) в пачке из картона.

### Состав:

Раствор для подкожного введения	1 амп.
<i>активное вещество:</i>	
экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка ( <i>Staphylococcus aureus</i> , штамм С-2)	
<i>вспомогательные вещества:</i> раствор хлорида натрия для инъекций 0,9%; фенол 0,025–0,05%	

### Описание:

*Раствор:* прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость с легким запахом фенола.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммунотропные средства](#)

## **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — противоаллергическое, противовоспалительное.

### **Фармакодинамика**

Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Уменьшает отек слизистых оболочек и кожи, снижает содержание эозинофилов и дегранулированных тучных клеток в очаге воспаления и повышает концентрацию секреторного Ig класса А в слизистых оболочках, увеличивает тем самым сопротивляемость их к инфекции. Снижает содержание маркеров аллергического воспаления: общего Ig класса Е в крови и оксида азота в выдыхаемом воздухе.

## **Противопоказания:**

повышенная чувствительность к препарату;

острая инфекция;

туберкулез в активной форме;

декомпенсированные заболевания внутренних органов;

беременность;

период грудного вскармливания;

детский возраст до 4 лет.

*С осторожностью:* наличие очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, синусит) из-за возможности их обострения.

## **Способ применения и дозы:**

*П/к.*

Детям от 4 до 6 лет — по 0,1 мл 1 раз в неделю; взрослым и детям старше 6 лет — по 0,2 мл 1 раз в неделю, курс — 5-10 нед. В течение года может быть проведено от 1 до 4 курсов. При поллинозе препарат вводится за 6-8 нед до периода цветения аллергенного растения; при частых респираторных инфекциях профилактику следует проводить весной и осенью.

## **Побочное действие:**

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабость, обострение хронического очага инфекции, кратковременное усиление кашля при хроническом бронхите, усиление высыпаний на коже при кожной аллергии. Эти симптомы, как правило, слабо выражены и преходящи, не требуют отмены препарата.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки не зарегистрированы.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Взаимодействие препарата Рузам® с другими ЛС не зарегистрировано. Рузам® может быть назначен вместе с антигистаминными препаратами, ГКС или антибиотиками.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Оставшийся в ампуле раствор не использовать.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.* Препарат не оказывает

## **Рузам (капли)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (в т.ч. управление автомобилем).

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Ruzam\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Ruzam_kapli)