

## [Рыбий жир очищенный для внутреннего применения](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Рыбий жир из печени тресковых рыб](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Масло для приема внутрь** в виде прозрачной маслянистой жидкости от светло-желтого до желтого цвета со специфическим непрогорклым запахом.

	<b>1 фл.</b>
рыбий жир	100 %

50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Действие препарата обусловлено содержанием витаминов А и D и ненасыщенных жирных кислот. Витамин А (ретинол) участвует в обменных процессах в слизистых оболочках и коже, в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения: обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей. Витамин D (колекальциферол) регулирует обмен кальция ( $Ca^{2+}$ ) и фосфатов, процесс построения структуры костей; повышает абсорбцию  $Ca^{2+}$  в кишечнике; ненасыщенные жирные кислоты принимают участие в синтезе арахидоновой кислоты, лейкотриенов и простагландинов; способствуют снижению холестерина в сыворотке крови, понижают агрегацию тромбоцитов, улучшают реологические свойства крови.

### **Показания к применению:**

— гипо- и авитаминоз А и D (частые респираторные заболевания, реконвалесценция, нарушения роста костей, снижение зрения, нарушение структуры кожи, волос, ногтей, зубов, рахит);

— профилактика остеопатии разного генеза.

### **Относится к болезням:**

- [Рахит](#)

- [Реконвалесценция](#)

## Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- гипокоагуляция;
- гемофилия;
- хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения);
- активная форма туберкулеза легких;
- тиреотоксикоз;
- хроническая почечная недостаточность;
- гипервитаминоз витаминов А и D;
- гиперкальциемия;
- гиперкальциурия;
- саркоидоз;
- кальциевый нефроуролитиаз;
- длительная иммобилизация;
- детский возраст до 3 месяцев.

*С осторожностью:* острый и хронический нефрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипотиреоз, период грудного вскармливания, органические поражения сердца, острые и хронические заболевания печени и почек, пожилой возраст.

## Способ применения и дозы:

Внутрь. Препарат рекомендуется принимать во время еды.

*Режим дозирования:* **детям с 3-х месяцев** - 1/2 чайной ложки (2,5 мл) в день; **детям в возрасте 1 года** - 1 чайную ложку (5 мл) в день; **детям с 2 лет** - по 1-2 чайные ложки в день; **детям с 3 до 6 лет** - по 1 десертной ложке (10 мл) в день; **детям с 7 лет и взрослым** - по 1 столовой ложке (15 мл) в день. Курс лечения назначает лечащий врач в зависимости от показаний к применению.

1 г препарата содержит: от 350 до 1000 МЕ витамина А, от 50 до 100 МЕ витамина D.

1 мл препарата содержит: от 320 до 927 МЕ витамина А, от 45,85 до 92,7 МЕ витамина D.

5 мл препарата содержит: от 1600 до 4635 МЕ витамина А, от 229,25 до 463,5 МЕ витамина D.

10 мл препарата содержит: от 3200 до 9270 МЕ витамина А, от 458,5 до 927 МЕ витамина D.

15 мл препарата содержит: от 4800 до 13905 МЕ витамина А, от 687,75 до 1390,5 МЕ витамина D.

## Побочное действие:

Аллергические реакции, диарея, снижение свертываемости крови, запах рыбы изо рта.

## Передозировка:

При продолжительном применении препарата может возникнуть сонливость, вялость, головная боль, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в костях нижних конечностей.

*Лечение:* симптоматическое, отмена препарата.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности не рекомендуется. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом!

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, содержащими витамины А и D, существует возможность развития витаминной интоксикации. Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата и лекарственных средств, влияющих на свертываемость крови.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом! Рекомендуется прекратить прием препарата не менее чем за 4 дня до проведения оперативного лечения или другого хирургического вмешательства.

### *Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью при острых и хронических заболеваниях почек.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью при острых и хронических заболеваниях печени.

### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью в пожилом возрасте.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 3 месяцев.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°C. Допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Rybiy\\_Zhir\\_Ochishchennyy\\_Dlya\\_Vnutrennego\\_Primeniya](http://drugs.thead.ru/Rybiy_Zhir_Ochishchennyy_Dlya_Vnutrennego_Primeniya)