Рыбий жир



Код АТХ:

- A11CB

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Рыбий жир из печени тресковых рыб

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые; содержимое капсул - слегка вязкое масло желтого цвета, прозрачное, без видимых частиц, с характерным запахом.

	1 капс.
рыбий жир	500 мг

Вспомогательные вещества: желатин - 128.95 мг, глицерол - 42.04 мг, сорбитол 70% некристаллизующийся - 17.19 мг, вода - 10.87 мг.

10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие продукта определяется, в первую очередь, содержанием полиненасыщенных жирных

кислот класса омега-3 (эйкозапентаеновой, докозагексаеновой). Эти кислоты являются структурными компонентами клеточных мембран, способствуют снижению уровня холестерина в крови, снижают содержание триглицеридов в результате уменьшения концентрации липопротеидов очень низкой плотности, понижают агрегацию тромбоцитов, улучшают реологические свойства крови.

Показания к применению:

— профилактика состояний, обусловленных дислипидемией (нарушение липидного обмена);

— комплексная терапия нарушений липидного обмена, включающая диету, статины, антиагреганты.

Противопоказания:

— хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения);

— одновременное применение фибратов, пероральных антикоагулянтов;

— при тяжелых травмах, хирургических операциях (в связи с риском увеличения времени кровотечения);

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 1-2 капсулы 3 раза/сут после еды, запивая холодной или чуть теплой водой.

Рекомендуется сразу проглатывать капсулы, запивая их большим количеством воды, не следует держать их во рту долгое время, т.к. желатин, входящий в состав оболочки, может сделать капсулу клейкой, что затруднит последующее проглатывание. Курс лечения - 2-3 мес. Далее рекомендуется сделать общий анализ крови и продолжить прием препарата в зависимости от результатов.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, снижение свертываемости крови, обострение хронического холецистита и панкреатита/диарея, запах рыбы изо рта.

Передозировка:

*Симптомы:*возможно обострение холелитиаза и хронического панкреатита.

*Лечение:*симптоматическое, отмена препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Пациентам, проходящим курс лечения в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или принимающим препараты, влияющие на скорость свертывания крови, не рекомендуется принимать Рыбий жир.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациенты, находящиеся на антикоагулянтной терапии, в период приема Рыбьего жира должны быть под постоянным врачебным наблюдением, а при необходимости следует проводить соответствующую коррекцию дозы антикоагулянта.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст.

Условия хранения:

Хранить в в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре 15-25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rybiy_zhir