

## Рыбий жир-Тева



### Код АТХ:

- [A11CB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Рыбий жир из печени тресковых рыб](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Капсулы** мягкие желатиновые; содержимое капсул - слегка вязкое масло желтого цвета, прозрачное, без видимых частиц, с характерным запахом.

	<b>1 капс.</b>
рыбий жир	500 мг

Вспомогательные вещества: желатин - 128.95 мг, глицерол - 42.04 мг, сорбитол 70% некристаллизующийся - 17.19 мг, вода - 10.87 мг.

10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Фармакологическое действие продукта определяется, в первую очередь, содержанием полиненасыщенных жирных кислот класса омега-3 (эйкозапентаеновой, докозагексаеновой). Эти кислоты являются структурными компонентами клеточных мембран, способствуют снижению уровня холестерина в крови, снижают содержание триглицеридов в результате уменьшения концентрации липопротеидов очень низкой плотности, понижают агрегацию тромбоцитов, улучшают реологические свойства крови.

### Показания к применению:

- профилактика состояний, обусловленных дислипидемией (нарушение липидного обмена);
- комплексная терапия нарушений липидного обмена, включающая диету, статины, антиагреганты.

### **Противопоказания:**

- хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения);
- одновременное применение фибратов, пероральных антикоагулянтов;
- при тяжелых травмах, хирургических операциях (в связи с риском увеличения времени кровотечения);
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь по 1-2 капсулы 3 раза/сут после еды, запивая холодной или чуть теплой водой.

Рекомендуется сразу проглатывать капсулы, запивая их большим количеством воды, не следует держать их во рту долгое время, т.к. желатин, входящий в состав оболочки, может сделать капсулу клейкой, что затруднит последующее проглатывание. Курс лечения - 2-3 мес. Далее рекомендуется сделать общий анализ крови и продолжить прием препарата в зависимости от результатов.

### **Побочное действие:**

*Возможны* аллергические реакции, снижение свертываемости крови, обострение хронического холецистита и панкреатита/диарея, запах рыбы изо рта.

### **Передозировка:**

*Симптомы:* возможно обострение холелитиаза и хронического панкреатита.

*Лечение:* симптоматическое, отмена препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано к применению при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Пациентам, проходящим курс лечения в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или принимающим препараты, влияющие на скорость свертывания крови, не рекомендуется принимать Рыбий жир.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Пациенты, находящиеся на антикоагулянтной терапии, в период приема Рыбьего жира должны быть под постоянным врачебным наблюдением, а при необходимости следует проводить соответствующую коррекцию дозы антикоагулянта.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре 15-25°C.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Rybiy\\_zhir-Teva](http://drugs.thead.ru/Rybiy_zhir-Teva)