Рыбий жир очищенный для внутреннего применения



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Рыбий жир из печени тресковых рыб

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Масло для приема внутрь*** в виде прозрачной маслянистой жидкости от светло-желтого до желтого цвета со специфическим непрогорклым запахом.

	1 фл.
рыбий жир	100 %

50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Действие препарата обусловлено содержанием витаминов A и D и ненасыщенных жирных кислот. Витамин A (ретинол) участвует в обменных процессах в слизистых оболочках и коже, в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения: обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей. Витамин D (колекальциферол) регулирует обмен кальция (Ca^{2+}) и фосфатов, процесс построения структуры костей; повышает абсорбцию Ca^{2+} в кишечнике; ненасыщенные жирные кислоты принимают участие в синтезе арахидоновой кислоты, лейкотриенов и простагландинов; способствуют снижению холестерина в сыворотке крови, понижают агрегацию тромбоцитов, улучшают реологические свойства крови.

Показания к применению:

— гипо- и авитаминоз A и D (частые респираторные заболевания, реконвалесценция, нарушения роста костей, снижение зрения, нарушение структуры кожи, волос, ногтей, зубов, рахит);

— профилактика остеопатии разного генеза.

Относится к болезням:

- Рахит

- Реконвалесценция

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— гипокоагуляция;

— гемофилия;

— хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения);

— активная форма туберкулеза легких;

— тиреотоксикоз;

— хроническая почечная недостаточность;

— гипервитаминоз витаминов A и D;

— гиперкальциемия;

— гиперкальциурия;

— саркоидоз;

— кальциевый нефроуролитиаз;

— длительная иммобилизация;

— детский возраст до 3 месяцев.

С осторожностью: острый и хронический нефрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипотиреоз, период грудного вскармливания, органические поражения сердца, острые и хронические заболевания печени и почек, пожилой возраст.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Препарат рекомендуется принимать во время еды.

Режим дозирования: **детям с 3-х месяцев** - 1/2 чайной ложки (2,5 мл) в день; **детям в возрасте 1 года** - 1 чайную ложку (5 мл) в день; **детям с 2 лет** - по 1-2 чайные ложки в день; **детям с 3 до 6 лет** - по 1 десертной ложке (10 мл) в день; **детям с 7 лет и взрослым** - по 1 столовой ложке (15 мл) в день. Курс лечения назначает лечаший врач в зависимости от показаний к применению.

1 г препарата содержит: от 350 до 1000 МЕ витамина A, от 50 до 100 МЕ витамина D.

1 мл препарата содержит: от 320 до 927 МЕ витамина A, от 45,85 до 92,7 МЕ витамина D.

5 мл препарата содержит: от 1600 до 4635 МЕ витамина A, от 229,25 до 463,5 МЕ витамина D.

10 мл препарата содержит: от 3200 до 9270 МЕ витамина A, от 458,5 до 927 МЕ витамина D.

15 мл препарата содержит: от 4800 до 13905 МЕ витамина A, от 687,75 до 1390,5 витамина D.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диарея, снижение свертываемости крови, запах рыбы изо рта.

Передозировка:

При продолжительном применении препарата может возникнуть сонливость, вялость, головная боль, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в костях нижних конечностей.

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности не рекомендуется. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, содержащими витамины A и D, существует возможность развития витаминной интоксикации. Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата и лекарственных средств, влияющих на свертываемость крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом! Рекомендуется прекратить прием препарата не менее чем за 4 дня до проведения оперативного лечения или другого хирургического вмешательства.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

При нарушениях функции почек

С осторожностью при острых и хронических заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при острых и хронических заболеваниях печени.

Применение в пожилом возрасте

С осторожностью в пожилом возрасте.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 3 месяцев.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 10°C. Допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Rybiy_zhir_ochishchennyy_dlya_vnutrennego_primeneniya